

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TOÁN THỰC TẾ

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Các dạng toán về lãi suất ngân hàng:

1. Lãi đơn: là số tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra, tức là tiền lãi của kì hạn trước không được tính vào vốn để tính lãi cho kì hạn kế tiếp, cho dù đến kì hạn người gửi không đến gửi tiền ra.

a) Công thức tính: Khách hàng gửi vào ngân hàng A đồng với lãi đơn $r\%$ /kì hạn thì số tiền khách hàng nhận được cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn ($n \in \mathbb{N}^*$) là:

$$S_n = A + nAr = A(1 + nr) \quad (0.1)$$

Chú ý: trong tính toán các bài toán lãi suất và các bài toán liên quan, ta nhớ $r\%$ là $\frac{r}{100}$.

b) Ví dụ: Chú Nam gửi vào ngân hàng 1 triệu đồng với lãi đơn 5%/năm thì sau 5 năm số tiền chú Nam nhận được cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?

Giải:

Số tiền cả gốc lẫn lãi chú Nam nhận được sau 5 năm là: $S_5 = 1 \cdot (1 + 5 \cdot 0,05) = 1,25$ (triệu đồng)

2. Lãi kép: tiền lãi của kì hạn trước nếu người gửi không rút ra thì được tính vào vốn để tính lãi cho kì hạn sau.

a) Công thức tính: Khách hàng gửi vào ngân hàng A đồng với lãi kép $r\%$ /kì hạn thì số tiền khách hàng nhận được cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn ($n \in \mathbb{N}^*$) là:

$$S_n = A(1 + r)^n \quad (0.2)$$

Chú ý: Từ công thức (2) ta có thể tính được:

$$n = \log_{(1+r)} \left(\frac{S_n}{A} \right) \quad (0.3)$$

$$r\% = \sqrt[n]{\frac{S_n}{A}} - 1 \quad (0.4)$$

$$A = \frac{S_n}{(1 + r)^n} \quad (0.5)$$

b) Một số ví dụ:

Ví dụ 1: Chú Việt gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi kép 5%/năm.

a) Tính số tiền cả gốc lẫn lãi chú Việt nhận được sau khi gửi ngân hàng 10 năm.

b) Với số tiền 10 triệu đó, nếu chú Việt gửi ngân hàng với lãi kép $\frac{5}{12}\%$ /tháng thì sau 10 năm chú Việt nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn hay ít hơn?

Giải:

a) Số tiền cả gốc lẫn lãi nhận được sau 10 năm với lãi kép 5%/năm là

$$S_{10} = 10 \cdot \left(1 + \frac{5}{100} \right)^{10} \approx 16,28894627 \text{ triệu đồng.}$$

b) Số tiền cả gốc lẫn lãi nhận được sau 10 năm với lãi kép $\frac{5}{12}\%$ /tháng là

$$S_{120} = 10 \cdot \left(1 + \frac{5}{12 \times 100} \right)^{120} \approx 16,47009498 \text{ triệu đồng.}$$

Vậy số tiền nhận được với lãi suất $\frac{5}{12}\%$ /tháng nhiều hơn.

Ví dụ 2:

- a) Bạn An gửi tiết kiệm một số tiền ban đầu là 1000000 đồng với lãi suất 0,58%/tháng (không kỳ hạn). Hỏi bạn An phải gửi bao nhiêu tháng thì được cả vốn lẫn lãi bằng hoặc vượt quá 1300000 đồng ?
- b) Với cùng số tiền ban đầu và cùng số tháng đó, nếu bạn An gửi tiết kiệm có kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 0,68%/tháng, thì bạn An sẽ nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? Biết rằng trong các tháng của kỳ hạn, chỉ cộng thêm lãi chứ không cộng vốn và lãi tháng trước để tính lãi tháng sau. Hết một kỳ hạn, lãi sẽ được cộng vào vốn để tính lãi trong kỳ hạn tiếp theo (nếu còn gửi tiếp), nếu chưa đến kỳ hạn mà rút tiền thì số tháng dư so với kỳ hạn sẽ được tính theo lãi suất không kỳ hạn.

Giải:

- a) Ta có $n = \log_{1,0058} \left(\frac{1300000}{1000000} \right) \approx 45,3662737$ nên để nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi bằng hoặc vượt quá 1300000 đồng thì bạn An phải gửi ít nhất là 46 tháng.

- b) Ta thấy 46 tháng là 15 kỳ hạn và thêm 1 tháng nên số tiền nhận được là

$$S = 10^6 \cdot 1,0068^{15} \cdot 1,0058 \approx 1361659,061.$$

Ví dụ 3: Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng thời gian vừa qua liên tục thay đổi. Bạn Châu gửi số tiền ban đầu là 5 triệu đồng với lãi suất 0,7% tháng chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,15% tháng trong nửa năm tiếp theo và bạn Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm đó lãi suất giảm xuống còn 0,9% tháng, bạn Châu tiếp tục gửi thêm một số tháng tròn nữa, khi rút tiền bạn Châu được cả vốn lẫn lãi là 5 747 478,359 đồng (chưa làm tròn). Hỏi bạn Châu đã gửi tiền tiết kiệm trong bao nhiêu tháng?

Giải:

Gọi X, Y ($X, Y \in \mathbb{Z}^+ : X, Y \leq 12$) lần lượt là số tháng bạn Châu đã gửi với lãi suất 0,7%/tháng và 0,9%/tháng thì ta có

$$\begin{aligned} 5 \cdot 10^6 \cdot 1,007^X \cdot 1,0115^6 \cdot 1,009^Y &= 5747478,359 \\ \Leftrightarrow 1,009^Y &= \frac{5747478,359}{5 \cdot 10^6 \cdot 1,007^X \cdot 1,0115^6} \\ \Leftrightarrow Y &= \log_{1,009} \frac{5747478,359}{5 \cdot 10^6 \cdot 1,007^X \cdot 1,0115^6} \end{aligned}$$

Nhập vào máy tính Mode7 nhập hàm số $f(X) = \log_{1,009} \frac{5747478,359}{5 \cdot 10^6 \cdot 1,007^X \cdot 1,0115^6}$, cho giá trị X chạy từ 1 đến 10 với STEP 1. Nhìn vào bảng kết quả ta được cặp số nguyên là $X = 5; Y = 4$.

Vậy bạn Châu đã gửi tiền tiết kiệm trong $5 + 6 + 4 = 15$ tháng.

3. Tiền gửi hàng tháng: Mỗi tháng gửi đúng cùng một số tiền vào 1 thời gian cố định.

a) Công thức tính: Đầu mỗi tháng khách hàng gửi vào ngân hàng số tiền A đồng với lãi kép $r\%$ /tháng thì số tiền khách hàng nhận được cả vốn lẫn lãi sau n tháng ($n \in \mathbb{N}^*$) (nhận tiền cuối tháng, khi ngân hàng đã tính lãi) là S_n .

Ý tưởng hình thành công thức:

- + Cuối tháng thứ nhất, khi ngân hàng đã tính lãi thì số tiền có được là

$$S_1 = A(1+r) = \frac{A}{r} \left[(1+r)^1 - 1 \right] (1+r)$$

- + Đầu tháng thứ hai, khi đã gửi thêm số tiền A đồng thì số tiền là

$$T_1 = A(1+r) + A = A \left[(1+r) + 1 \right] = A \frac{\left[(1+r)^2 - 1 \right]}{(1+r) - 1} = \frac{A}{r} \left[(1+r)^2 - 1 \right]$$

+ Cuối tháng thứ hai, khi ngân hàng đã tính lãi thì số tiền có được là

$$S_2 = \frac{A}{r} \left[(1+r)^2 - 1 \right] (1+r)$$

+ Từ đó ta có công thức tổng quát

$$S_n = \frac{A}{r} \left[(1+r)^n - 1 \right] (1+r) \quad (0.6)$$

Chú ý: Từ công thức (1.6) ta có thể tính được:

$$n = \log_{(1+r)} \left(\frac{S_n \cdot r}{A(1+r)} + 1 \right) \quad (0.7)$$

$$A = \frac{S_n \cdot r}{(1+r) \left[(1+r)^n - 1 \right]} \quad (0.8)$$

b) Một số ví dụ:

Ví dụ 1: Đầu mỗi tháng ông Mạnh gửi ngân hàng 580000 đồng với lãi suất 0,7%/tháng. Sau 10 tháng thì số tiền ông Mạnh nhận được cả gốc lẫn lãi (sau khi ngân hàng đã tính lãi tháng cuối cùng) là bao nhiêu?

Giải:

$$S_{10} = \frac{580000}{0,007} \left[(1,007)^{10} - 1 \right] \cdot 1,007 \approx 6028005,598 \text{ đồng}$$

Ví dụ 2: Ông Nghĩa muốn có ít nhất 100 triệu đồng sau 10 tháng kể từ khi gửi ngân hàng với lãi 0,7%/tháng thì mỗi tháng ông Nghĩa phải gửi số tiền ít nhất bao nhiêu?

Giải:

$$A = \frac{100.0,007}{1,007 \left[(1,007)^{10} - 1 \right]} \approx 9,621676353 \text{ đồng}$$

Ví dụ 3: Đầu mỗi tháng anh Thắng gửi vào ngân hàng số tiền 3 triệu đồng với lãi suất 0,6%/tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng (khi ngân hàng đã tính lãi) thì anh Thắng được số tiền cả gốc lẫn lãi từ 100 triệu trở lên?

Giải:

$$n = \log_{1,006} \left(\frac{100.0,006}{3.1,006} + 1 \right) \approx 30,31174423$$

Vậy anh Thắng phải gửi ít nhất là 31 tháng mới được số tiền cả gốc lẫn lãi từ 100 triệu trở lên.

Ví dụ 4: Đầu mỗi tháng bác Dinh gửi vào ngân hàng số tiền 3 triệu đồng sau 1 năm bác Dinh nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là 40 triệu. Hỏi lãi suất ngân hàng là bao nhiêu phần trăm mỗi tháng?

Giải:

Ta có $40 = \frac{3}{r} \left[(1+r)^{12} - 1 \right] (1+r)$ nên nhập vào máy tính phương trình

$$\frac{3}{X} \left[(1+X)^{12} - 1 \right] (1+X) - 40 \text{ nhấn } \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{CALC}} \text{ với } X=0 \text{ ta được } X=0,016103725$$

Vậy lãi suất hàng tháng vào khoảng 1,61%/tháng

4. Gửi ngân hàng và rút tiền gửi hàng tháng:

a) Công thức tính: Gửi ngân hàng số tiền là A đồng với lãi suất $r\%$ /tháng. Mỗi tháng vào ngày ngân hàng tính lãi, rút ra số tiền là X đồng. Tính số tiền còn lại sau n tháng là bao nhiêu?

Ý tưởng hình thành công thức:

Cuối tháng thứ nhất, khi ngân hàng đã tính lãi thì số tiền có được là $T_1 = A(1+r)$ và sau khi rút số tiền còn lại là

$$S_1 = A(1+r) - X = A(1+r) - X \frac{(1+r)-1}{r}$$

Cuối tháng thứ hai, khi ngân hàng đã tính lãi thì số tiền có được là

$$T_2 = [A(1+r) - X](1+r) = A(1+r)^2 - X(1+r)$$

và sau khi rút số tiền còn lại là

$$S_2 = A(1+r)^2 - X(1+r) - X = A(1+r)^2 - X[(1+r)+1] = A(1+r)^2 - X \frac{(1+r)^2 - 1}{r}$$

Từ đó ta có công thức tổng quát số tiền còn lại sau n tháng là

$$S_n = A(1+r)^n - X \frac{(1+r)^n - 1}{r} \quad (0.9)$$

Chú ý: Từ công thức (9) ta có thể tính được:

$$X = [A(1+r)^n - S_n] \frac{r}{(1+r)^n - 1} \quad (0.10)$$

b) Một số ví dụ:

Ví dụ 1: Anh Chiến gửi ngân hàng 20 triệu đồng với lãi suất 0,75%/tháng. Mỗi tháng vào ngày ngân hàng tính lãi, anh Chiến đến ngân hàng rút 300 nghìn đồng để chi tiêu. Hỏi sau 2 năm số tiền anh Chiến còn lại trong ngân hàng là bao nhiêu?

Giải:

$$S_{24} = 2.10^7 \cdot (1,0075)^{24} - 3.10^5 \cdot \frac{(1,0075)^{24} - 1}{0,0075} \approx 16071729,41 \text{ đồng.}$$

Ví dụ 2: Anh Chiến gửi ngân hàng 20 triệu đồng với lãi suất 0,7%/tháng. Mỗi tháng vào ngày ngân hàng tính lãi, anh Chiến rút một số tiền như nhau để chi tiêu. Hỏi số tiền mỗi tháng anh Chiến rút là bao nhiêu để sau 5 năm thì số tiền vừa hết?

Giải:

$$\text{Vì } S_n = 0 \text{ nên áp dụng công thức (1.10) thì } X = \frac{2.10^7 \cdot (1,007)^{60} \cdot 0,007}{(1,007)^{60} - 1} \approx 409367,3765 \text{ đồng.}$$

5. Vay vốn trả góp: Vay ngân hàng số tiền là A đồng với lãi suất $r\%$ /tháng. Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ cách nhau đúng một tháng, mỗi hoàn nợ số tiền là X đồng và trả hết tiền nợ sau đúng n tháng.

a) Công thức tính: Cách tính số tiền còn lại sau n tháng giống hoàn toàn công thức tính gửi ngân hàng và rút tiền hàng tháng nên ta có

$$S_n = A(1+r)^n - X \frac{(1+r)^n - 1}{r} \quad (0.11)$$

Để sau đúng n tháng trả hết nợ thì $S_n = 0$ nên

$$A(1+r)^n - X \frac{(1+r)^n - 1}{r} = 0 \quad (0.12)$$

và

$$X = \frac{A(1+r)^n \cdot r}{(1+r)^n - 1} \quad (0.13)$$

b) Một số ví dụ:

Ví dụ 1: Chị Năm vay trả góp ngân hàng số tiền 50 triệu đồng với lãi suất 1,15%/tháng trong vòng 2 năm thì mỗi tháng chị Năm phải trả số tiền bao nhiêu?

Giải:

$$\text{Số tiền chị Năm phải trả mỗi năm là: } X = \frac{5.10^7 \cdot (1,0115)^{48} \cdot 0,0115}{(1,0115)^{48} - 1} \approx 1361312,807 \text{ đồng}$$

Ví dụ 2:

a) Anh Ba vay trả góp ngân hàng số tiền 500 triệu đồng với lãi suất 0,9%/tháng, mỗi tháng trả 15 triệu đồng. Sau bao nhiêu tháng thì anh Ba trả hết nợ?

b) Mỗi tháng anh Ba gửi vào ngân hàng số tiền 15 triệu đồng với lãi suất 0,7%/tháng thì sau thời gian trả nợ ở câu a), số tiền cả gốc lẫn lãi anh Ba nhận được là bao nhiêu?

Giải:

a) Ta có $500 \cdot (1,009)^n - 15 \cdot \frac{(1,009)^n - 1}{0,009} = 0$ giải được $X = 39,80862049$ nên phải trả nợ trong vòng 40 tháng.

b) Sau 40 tháng số tiền nhận được là $S_{40} = \frac{15}{0,007} \left[(1,007)^{40} - 1 \right] \cdot 1,007 \approx 694,4842982$ triệu đồng.

6. Bài toán tăng lương: Một người được lãnh lương khởi điểm là A đồng/tháng. Cứ sau n tháng thì lương người đó được tăng thêm $r\%$ /tháng. Hỏi sau kn tháng người đó lĩnh được tất cả số tiền là bao nhiêu?

Công thức tính: Tổng số tiền nhận được sau kn tháng là $S_{kn} = Ak \frac{(1+r)^k - 1}{r}$ (0.14)

Ví dụ: Một người được lãnh lương khởi điểm là 3 triệu đồng/tháng. Cứ 3 tháng thì lương người đó được tăng thêm 7% /tháng. Hỏi sau 36 năm người đó lĩnh được tất cả số tiền là bao nhiêu?

Giải:

$$S_{36} = 3 \cdot 10^6 \cdot 12 \cdot \frac{(1,07)^{12} - 1}{0,07} \approx 643984245,8 \text{ đồng}$$

II. Bài toán tăng trưởng dân số:

Công thức tính tăng trưởng dân số $X_m = X_n (1+r)^{m-n}$, $(m, n \in \mathbb{Z}^+, m \geq n)$ (1.1)

Trong đó:

$r\%$ là tỉ lệ tăng dân số từ năm n đến năm m

X_m dân số năm m

X_n dân số năm n

Từ đó ta có công thức tính tỉ lệ tăng dân số là $r\% = \sqrt[m-n]{\frac{X_m}{X_n}} - 1$ (1.2)

Ví dụ: Theo kết quả điều tra dân số, dân số trung bình nước Việt Nam qua một số mốc thời gian (Đơn vị: 1.000 người):

Năm	1976	1980	1990	2000	2010
Số dân	49160	53722	66016,7	77635	88434,6

a) Tính tỉ lệ % tăng dân số trung bình mỗi năm trong các giai đoạn 1976-1980, 1980-1990, 1990-2000, 2000-2010. Kết quả chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy. Giả sử tỉ lệ % tăng dân số trung bình mỗi năm không đổi trong mỗi giai đoạn.

b) Nếu cứ duy trì tỉ lệ tăng dân số như ở giai đoạn 2000-2010 thì đến năm 2015 và 2020 dân số của Việt Nam là bao nhiêu?

- c) Để kìm hãm đà tăng dân số, người ta đề ra phương án: Kể từ năm 2010, mỗi năm phần đầu giảm bớt $x\%$ (x không đổi) so với tỉ lệ % tăng dân số năm trước (nghĩa là nếu năm nay tỉ lệ tăng dân số là $a\%$ thì năm sau là $(a-x)\%$). Tính x để số dân năm 2015 là 92,744 triệu người.

Giải:

$$a) + \text{Tỉ lệ tăng dân số giai đoạn 1976 – 1980 là } r\% = \left(\sqrt[4]{\frac{53722}{49160}} - 1 \right) \cdot 100 \approx 2,243350914\%$$

$$+ \text{Tỉ lệ tăng dân số giai đoạn 1980 – 1990 là } r\% = \left(\sqrt[10]{\frac{66016,7}{53722}} - 1 \right) \cdot 100 \approx 2,082233567\%$$

$$+ \text{Tỉ lệ tăng dân số giai đoạn 1990 – 2000 là } r\% = \left(\sqrt[10]{\frac{77635}{66016,7}} - 1 \right) \cdot 100 \approx 1,63431738\%$$

$$+ \text{Tỉ lệ tăng dân số giai đoạn 2000 – 2010 là } r\% = \left(\sqrt[10]{\frac{88434,6}{77635}} - 1 \right) \cdot 100 \approx 1,31096821\%$$

Giai đoạn	1976-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010
Tỉ lệ % tăng dân số/năm	2,2434%	2,0822%	1,6344%	1,3109%

- b) Nếu duy trì tỉ lệ tăng dân số như ở giai đoạn 2000-2010 thì:

Đến năm 2015 dân số nước ta sẽ là: $88434,6(1+1,3109/100)^5 \approx 94,385$ triệu người.

Đến năm 2020 dân số nước ta sẽ là: $88434,6(1+1,3109/100)^{10} \approx 100,736$ triệu người.

- c) Nếu thực hiện phương án giảm dân số đó thì đến năm 2015 dân số nước ta là:

$$88434,6(1,013109-x)(1,013109-2x)(1,013109-3x)(1,013109-4x)(1,013109-5x)$$

Ta có phương trình: $88434,6(1,013109-x)(1,013109-2x)\dots(1,013109-5x) = 92744$

giải phương trình ta được: $x\% \approx 0,1182\%$

III. Lãi kép liên tục:

Gửi vào ngân hàng A đồng với lãi kép $r\%/năm$ thì số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi sau n năm ($n \in \mathbb{N}^*$) là: $S_n = A(1+r)^n$. Giả sử ta chia mỗi năm thành m kì hạn để tính lãi và lãi suất mỗi kì hạn

là $\frac{r}{m}\%$ thì số tiền thu được sau n năm là $S_n = A \left(1 + \frac{r}{m} \right)^{m \cdot n}$

Khi tăng số kì hạn của mỗi năm lên vô cực, tức là $m \rightarrow +\infty$, gọi là hình thức lãi kép liên tục thì

người ta chứng minh được số tiền nhận được cả gốc lẫn lãi là: $S = Ae^{n \cdot r}$ (3.1)

Công thức (3.1) còn gọi là công thức tăng trưởng mũ.

Ví dụ 1: Sự tăng trưởng dân số được ước tính theo công thức tăng trưởng mũ. Biết rằng tỉ lệ tăng dân số thế giới hàng năm là 1,32%, năm 2013 dân số thế giới vào khoảng 7095 triệu người. Khi đó dự đoán dân số thế giới năm 2020 sẽ là bao nhiêu?

Giải:

Theo công thức tăng trưởng mũ thì dự đoán dân số năm 2010 là $S = 7095 \cdot e^{7,0,0132} \approx 7781$ triệu người

Ví dụ 2: Biết rằng đầu năm 2010, dân số Việt Nam là 86932500 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,7% và sự tăng dân số được tính theo công thức tăng trưởng mũ. Hỏi cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 100 triệu người?

Giải:

$$\text{Ta có } 100 = 86,9325.e^{n.0,017} \Leftrightarrow n = \frac{\ln \frac{100}{86,9325}}{0,017} \approx 8,2$$

Vậy cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm 2018 dân số nước ta ở mức 100 triệu người.

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

- Câu 1.** Ông An gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền a đồng, với lãi suất $r\%$ một tháng, theo phương thức lãi đơn. Hỏi sau n tháng ông An nhận được số tiền cả gốc và lãi được tính theo công thức nào?
- A. $a + nar$. B. nar . C. $a(1+r)^n$. D. $na(1+r)$.
- Câu 2.** Bà Mai gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank số tiền 50 triệu đồng với lãi suất 0,79% một tháng, theo phương thức lãi kép. Tính số tiền cả vốn lẫn lãi bà Mai nhận được sau 2 năm? (làm tròn đến hàng nghìn)
- A. 60393000. B. 50793000. C. 50790000. D. 59480000.
- Câu 3.** Chị Hà gửi ngân hàng 3350000 đồng, theo phương thức lãi đơn, với lãi suất 0,4% trên nửa năm. Hỏi ít nhất bao lâu chị rút được cả vốn lẫn lãi là 4020000 đồng?
- A. 5 năm. B. 30 tháng. C. 3 năm. D. 24 tháng.
- Câu 4.** Tính theo phương thức lãi đơn, để sau 2,5 năm rút được cả vốn lẫn lãi số tiền là 10892000 đồng với lãi suất $\frac{5}{3}\%$ một quý thì bạn phải gửi tiết kiệm số tiền bao nhiêu?
- A. 9336000. B. 10456000. C. 617000. D. 2108000.
- Câu 5.** Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng một số tiền là A đồng, với lãi suất $m\%$ một tháng. Nếu người này không rút tiền lãi ra thì cuối N tháng số tiền nhận được cả gốc và lãi được tính theo công thức nào?
- A. $A(1+m)^N$. B. $\frac{A}{m}[(1+m)^N - 1]$.
C. $\frac{A}{m}[(1+m)^{N+1} - (1+m)]$. D. $A + 2Am + \dots + Nam$.
- Câu 6.** Bạn Lan gửi 1500 USD với lãi suất đơn cố định theo quý. Sau 3 năm, số tiền bạn ấy nhận được cả gốc lẫn lãi là 2320 USD. Hỏi lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu một quý? (làm tròn đến hàng phần nghìn)
- A. 0,182. B. 0,046. C. 0,015. D. 0,037.
- Câu 7.** Chị Thanh gửi ngân hàng 155 triệu đồng, với lãi suất 1,02% một quý. Hỏi sau một năm số tiền lãi chị nhận được là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng nghìn)
- A. 161421000. B. 6324000. C. 1581000. D. 6421000.
- Câu 8.** Hãy cho biết lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu một năm nếu bạn gửi 15,625 triệu đồng sau 3 năm rút được cả vốn lẫn lãi số tiền là 19,683 triệu đồng theo phương thức lãi kép?
- A. 9%. B. 8%. C. 0,75%. D. $\frac{2}{3}\%$.
- Câu 9.** Một khách hàng gửi tiết kiệm 64 triệu đồng, với lãi suất 0,85% một tháng. Hỏi người đó phải mất ít nhất mấy tháng để được số tiền cả gốc lẫn lãi không dưới 72 triệu đồng?
- A. 13. B. 14. C. 15. D. 18.
- Câu 10.** Anh Thành trúng vé số giải thưởng 125 triệu đồng, sau khi trích ra 20% số tiền để chiêu đãi bạn bè và làm từ thiện, anh gửi số tiền còn lại vào ngân hàng với lãi suất 0,31% một tháng. Dự kiến 10 năm sau, anh rút tiền cả vốn lẫn lãi cho con gái vào đại học. Hỏi khi đó anh Thành rút được bao nhiêu tiền? (làm tròn đến hàng nghìn)
- A. 144980000. B. 103144000. C. 181225000. D. 137200000.
- Câu 11.** Bà An gửi tiết kiệm 53 triệu đồng theo kỳ hạn 3 tháng. Sau 2 năm, bà ấy nhận được số tiền cả gốc và lãi là 61 triệu đồng. Hỏi lãi suất ngân hàng là bao nhiêu một tháng (làm tròn đến hàng phần nghìn)? Biết rằng trong các tháng của kỳ hạn, chỉ cộng thêm lãi chứ không cộng vốn và

lãi tháng trước để tính lãi tháng sau; hết một kỳ hạn lãi sẽ được cộng vào vốn để tính lãi trong đủ một kỳ hạn tiếp theo.

A. 0,018 . B. 0,073 . C. 0,006 . D. 0,019 .

Câu 12. Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng số tiền là 1000000 đồng, với lãi suất 0,8% một tháng. Sau một năm người ấy rút cả vốn và lãi để mua vàng thì số chỉ vàng mua được là bao nhiêu? Biết giá vàng là 3575000 / chỉ.

A. 5 . B. 4 . C. 6 . D. 3 .

Câu 13. Anh Bảo gửi 27 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kỳ hạn là một quý, với lãi suất 1,85% một quý. Hỏi thời gian nhanh nhất là bao lâu để anh Bảo có được ít nhất 36 triệu đồng tính cả vốn lẫn lãi?

A. 19 quý. B. 15 quý. C. 4 năm. D. 5 năm .

Câu 14. Bà Tư gửi tiết kiệm 75 triệu đồng vào ngân hàng Agribank theo kỳ hạn 3 tháng và lãi suất 0,59% một tháng. Nếu bà không rút lãi ở tất cả các định kỳ thì sau 3 năm bà ấy nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu (làm tròn tới hàng nghìn)? Biết rằng trong các tháng của kỳ hạn, chỉ cộng thêm lãi chứ không cộng vốn và lãi tháng trước để tính lãi tháng sau; hết một kỳ hạn lãi sẽ được cộng vào vốn để tính lãi trong đủ một kỳ hạn tiếp theo.

A. 92576000 . B. 80486000 . C. 92690000 . D. 90930000 .

Câu 15. Bạn muốn có 3000 USD để đi du lịch châu Âu. Để sau 4 năm thực hiện được ý định thì hàng tháng bạn phải gửi tiết kiệm bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị)? Biết lãi suất 0,83% một tháng.

A. 62 USD. B. 61 USD. C. 51 USD . D. 42 USD.

Câu 16. Chị Vân muốn mua một chiếc xe máy Sirius giá 25 triệu đồng. Nếu sau 3 năm trả hết nợ thì mỗi tháng chị phải gửi vào ngân hàng số tiền như nhau là bao nhiêu (làm tròn tới hàng nghìn)? Biết lãi suất 0,39% một tháng.

A. 603000 . B. 645000 . C. 604000 . D. 646000 .

Câu 17. Một sinh viên muốn có 12 triệu đồng để mua laptop nên mỗi tháng gửi vào ngân hàng 250000 đồng với lãi suất 0,72% một tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng anh ta đủ tiền mua laptop?

A. 41 . B. 36 . C. 42 . D. 37 .

Câu 18. Ông Minh gửi vào ngân hàng G đồng, lãi suất $d\%$ một tháng theo phương thức lãi kép. Mỗi tháng ông rút ra X đồng vào ngày ngân hàng tính lãi. Hỏi sau n tháng số tiền còn lại được tính theo công thức nào sau đây:

A. $G(1+nd) - X \frac{(1+d)^n - 1}{d}$. B. $G(1+d)^n - X \frac{(1+d)^n - 1}{d}$.

C. $G(1+d)^n - nX$. D. $(G - nX)d$.

Câu 19. Một khách hàng gửi ngân hàng 20 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng, với lãi suất 0,65% một tháng theo phương thức lãi kép. Hỏi sau bao lâu vị khách này mới có số tiền lãi nhiều hơn số tiền gốc ban đầu gửi ngân hàng? Giả sử người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ.

A. 8 năm 11 tháng. B. 19 tháng. C. 18 tháng. D. 9 năm.

Câu 20. Một người vay ngân hàng số tiền 350 triệu đồng, mỗi tháng trả góp 8 triệu đồng và lãi suất cho số tiền chưa trả là 0,79% một tháng. Kỳ trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất. Hỏi số tiền phải trả ở kỳ cuối là bao nhiêu để người này hết nợ ngân hàng? (làm tròn đến hàng nghìn)

A. 2921000 . B. 7084000 . C. 2944000 . D. 7140000 .

Câu 21. Tính đến đầu năm 2011, dân số toàn tỉnh Bình Phước đạt gần 905.300, mức tăng dân số là 1,37% mỗi năm. Dân số tỉnh Bình Phước đến hết năm 2025 là

A. 1050761. B. 1110284. C. 1095279. D. 1078936.

- Câu 22.** Tính đến đầu năm 2011, dân số toàn tỉnh Bình Phước đạt gần 905.300, mức tăng dân số là 1,37% mỗi năm. Tỉnh thực hiện tốt chủ trương 100% trẻ em đúng độ tuổi đều vào lớp 1. Đến năm học 2024-2025 ngành giáo dục của tỉnh cần chuẩn bị bao nhiêu phòng học cho học sinh lớp 1, mỗi phòng dành cho 35 học sinh? (Giả sử trong năm sinh của lứa học sinh vào lớp 1 đó toàn tỉnh có 2400 người chết, số trẻ tử vong trước 6 tuổi không đáng kể)
A. 458. B. 222. **C. 459.** D. 221.
- Câu 23.** Tính đến đầu năm 2011, toàn tỉnh Bình Dương có 1.691.400 người, đến đầu năm 2015 dân số của tỉnh Bình Dương sẽ là 1.802.500 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của tỉnh Bình Dương tăng bao nhiêu phần trăm?
A. 1,6%. B. 1,3%. C. 1,2%. D. 16,4%.
- Câu 24.** Dân số thế giới cuối năm 2010, ước tính 7 tỉ người. Hỏi với mức tăng trưởng 1,5% mỗi năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm nữa dân số thế giới sẽ lên đến 10 tỉ người?
A. 29. B. 23. C. 28. **D. 24.**
- Câu 25.** Dân số thế giới cuối năm 2010, ước tính 7 tỉ người. Hỏi với mức tăng trưởng dân số 1,5% mỗi năm thì cuối năm 2020 dân số thế giới là bao nhiêu?
A. 8,12 tỉ người. B. 8,05 tỉ người.
C. 8 tỉ người. D. 8,10 tỉ người.
- Câu 26.** Tỷ lệ tăng dân số hàng năm ở Việt Nam được duy trì ở mức 1,05%. Theo số liệu của Tổng Cục Thống Kê, dân số của Việt Nam năm 2014 là 90.728.900 người. Với tốc độ tăng dân số như thế thì vào năm 2030, dân số của Việt Nam là:
A. 106.118.331 người. B. 198.049.810 người.
C. 107.232.574 người. D. 108.358.516 người.
- Câu 27.** Tới cuối năm 2013, dân số Nhật Bản đã giảm 0,17% xuống còn 127.298.000 người. Hỏi với tốc độ giảm dân số như vậy thì đến cuối năm 2023 dân số Nhật Bản còn bao nhiêu người?
A. 125.150.414 người. B. 125.363.532 người.
C. 125.154.031 người. D. 124.937.658 người.
- Câu 28.** Một huyện A có 100 000 dân. Với mức tăng dân số bình quân 1,5% năm thì sau n năm dân số sẽ vượt 130 000 dân. Hỏi n nhỏ nhất bao nhiêu?
A. 17. **B. 18.** C. 19. D. 16.
- Câu 29.** Một huyện A có 100 000 dân. Với mức tăng dân số bình quân 1,8% năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm nữa dân số sẽ vượt 150 000 dân.
A. 23. B. 22. C. 27. D. 28.
- Câu 30.** Chú Việt gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi suất 5%/năm. Tiền lãi năm trước được cộng dồn vào tiền gốc để tính tiền lãi năm sau. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì chú Việt thu được gấp đôi số tiền đã gửi?
A. 16. B. 14. **C. 15.** D. 20.
- Câu 31.** Hàng tháng, một người gửi tiết kiệm ngân hàng số tiền 2000000 đồng với lãi suất cố định 0.6%/tháng. Hỏi sau 5 năm, người đó có tổng số tiền (gồm tiền gốc đã gửi và tiền lãi) là bao nhiêu. Biết rằng trong quá trình gửi người đó không rút tiền lãi và lãi suất không thay đổi.
A. $2000000(1+0.006)\frac{(1.006)^{60}-1}{0.006}$ B. $2000000(1.06)\frac{(1.06)^{60}-1}{0.06}$
C. $2000000(1.6)\frac{(1.6)^{60}-1}{0.6}$ D. $2000000(1.0006)\frac{(1.0006)^{60}-1}{0.0006}$
- Câu 32.** Chú Tư gửi vào ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất 0,6%/tháng. Sau mỗi tháng, chú Tư đến ngân hàng rút mỗi tháng 3 triệu đồng để chi tiêu cho đến khi hết tiền thì thôi. Sau một số tròn tháng thì chú Tư rút hết tiền cả gốc lẫn lãi. Biết trong suốt thời gian đó, ngoài số tiền rút mỗi

tháng chủ Tư không rút thêm một đồng nào kể cả gốc lẫn lãi và lãi suất không đổi. Vậy tháng cuối cùng chủ Tư sẽ rút được số tiền là bao nhiêu (làm tròn đến đồng)?

- A. 1840270 đồng. B. 3000000 đồng.
C. 1840269 đồng. D. 1840268 đồng.

Câu 33. Ông Năm gửi 320 triệu đồng ở hai ngân hàng X và Y theo phương thức lãi kép. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng X với lãi suất 2,1% một quý trong thời gian 15 tháng. Số tiền còn lại gửi ở ngân hàng Y với lãi suất 0,73% một tháng trong thời gian 9 tháng. Tổng lợi tức đạt được ở hai ngân hàng là 27507768,13 (chưa làm tròn). Hỏi số tiền ông Năm lần lượt gửi ở ngân hàng X và Y là bao nhiêu?

- A. 140 triệu và 180 triệu. B. 180 triệu và 140 triệu.
C. 200 triệu và 120 triệu. D. 120 triệu và 200 triệu.

Câu 34. Anh Bình vay ngân hàng 2 tỷ đồng để xây nhà và trả dần mỗi năm 500 triệu đồng. Kỳ trả đầu tiên là sau khi nhận vốn với lãi suất trả chậm 9% một năm. Hỏi sau mấy năm anh Bình mới trả hết nợ đã vay?

- A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 35. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng hiện nay là 8,2% một năm đối với kỳ hạn một năm. Để khuyến mãi, ngân hàng A đưa ra dịch vụ mới như sau: nếu khách hàng gửi tiết kiệm năm đầu thì lãi suất là 8,2% một năm; sau đó, lãi suất năm sau hơn lãi suất năm trước đó là 0,12%. Hỏi nếu gửi 1,5 triệu đồng theo dịch vụ đó thì sau 7 năm số tiền sẽ nhận được cả gốc và lãi là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị)

- A. 2609233. B. 2665464. C. 2665463. D. 2609234.

Câu 36. Theo chính sách tín dụng của chính phủ hỗ trợ sinh viên vay vốn trang trải học tập: mỗi sinh viên được vay tối đa 900000 đồng/ tháng (9 triệu/ năm học), với lãi suất 0,45% một tháng. Mỗi năm lập thủ tục vay 2 lần ứng với 2 học kỳ và được nhận tiền vay đầu mỗi học kỳ (mỗi lần nhận tiền vay là 4,5 triệu). Giả sử sinh viên A trong thời gian học đại học 5 năm vay tối đa theo chính sách thì tổng số tiền nợ bao gồm cả lãi là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị)

- A. 52343156 B. 52343155 C. 46128921 D. 96128922

Câu 37. Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng khoảng tiền cố định với lãi suất 0.6%/tháng và lãi suất hàng tháng được nhập vào vốn. Hỏi sau bao lâu thì người đó thu được số tiền gấp hơn ba ban đầu?

- A. 184 tháng B. 183 tháng C. 186 tháng D. 185 tháng

Câu 38. Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu $mmHg$) suy giảm mũ so với độ cao x (đo bằng mét), tức là P giảm theo công thức: $P = P_0 e^{xi}$, trong đó $P_0 = 760mmHg$ là áp suất ở mực nước biển ($x = 0$), i là hệ số suy giảm. Biết rằng, ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 672.72 $mmHg$. Hỏi áp suất của không khí ở độ cao 12km bằng bao nhiêu? (các kết quả giữ lại sau dấu thập phân 7 chữ số)

- A. 178,8176855 B. 176,8176855 C. 177,8176855 D. 175,8176855

Câu 39. Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu $mmHg$) suy giảm mũ so với độ cao x (đo bằng mét), tức là P giảm theo công thức: $P = P_0 e^{xi}$, trong đó $P_0 = 760mmHg$ là áp suất ở mực nước biển ($x = 0$), i là hệ số suy giảm. Biết rằng, ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 672.72 $mmHg$. Ở Mỹ, những người có thể lên đến độ cao 80.2 km được xem là những nhà du hành vũ trụ, hỏi áp suất không khí ở độ cao 80.2km là bao nhiêu? (các kết quả giữ lại sau dấu thập phân 9 chữ số)

- A. 0.042842767 B. 0.052842767 C. 0.062842767 D. 0.032842767

Câu 40. Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức: $m(t) = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, trong đó m_0 là khối lượng ban đầu của chất phóng xạ (tại thời điểm $t = 0$); T là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa khối lượng chất phóng xạ bị biến thành chất khác). Chu kì bán rã của Cabon ^{14}C là khoảng 5730 năm. Cho trước mẫu Cabon có khối lượng 100g. Hỏi sau khoảng thời gian t thì khối lượng còn bao nhiêu?

A. $m(t) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{5730}{t}}$ B. $m(t) = 100 \cdot e^{-\frac{t \ln 2}{5730}}$ C. $m(t) = 100 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{100t}{5730}}$ D. $m(t) = 100 \cdot e^{-\frac{100t}{5730}}$

Câu 41. Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức: $m(t) = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, trong đó m_0 là khối lượng ban đầu của chất phóng xạ (tại thời điểm $t = 0$); T là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa khối lượng chất phóng xạ bị biến thành chất khác). Chu kì bán rã của Cabon ^{14}C là khoảng 5730 năm. Người ta tìm được trong một mẫu đồ cổ một lượng Cabon và xác định được nó đã mất khoảng 25% lượng Cabon ban đầu của nó. Hỏi mẫu đồ cổ đó có tuổi là bao nhiêu?

A. 2400 năm B. 2300 năm C. 2387 năm D. 2378 năm

Câu 42. Một nghiên cứu cho thấy một nhóm học sinh được cho xem cùng một danh sách các loài động vật và được kiểm tra lại xem họ nhớ bao nhiêu % mỗi tháng. Sau t tháng, khả năng nhớ trung bình của nhóm học sinh được cho bởi công thức $M(t) = 75 - 20 \ln(t+1)$, $t \geq 0$ (đơn vị %). Hỏi sau khoảng bao lâu thì nhóm học sinh nhớ được danh sách đó dưới 10%?

A. 25 tháng B. 23 tháng C. 24 tháng D. 22 tháng

Câu 43. Một công ty vừa tung ra thị trường sản phẩm mới và họ tổ chức quảng cáo trên truyền hình mỗi ngày. Một nghiên cứu thị trường cho thấy, nếu sau x quảng cáo được phát thì số % người xem mua sản phẩm là $P(x) = \frac{100}{1 + 49e^{-0.015x}}$, $x \geq 0$. Hãy tính số quảng cáo được phát tối thiểu để số người mua đạt hơn 75%.

A. 343 B. 333 C. 330 D. 323

Câu 44. Cường độ ánh sáng đi qua môi trường khác không khí (chẳng hạn sương mù, nước,...) sẽ giảm dần tùy thuộc độ dày của môi trường và hằng số μ gọi là khả năng hấp thụ của môi trường, tùy thuộc môi trường thì khả năng hấp thụ tính theo công thức $I = I_0 e^{-\mu x}$ với x là độ dày của môi trường đó và được tính bằng đơn vị mét. Biết rằng nước biển có $\mu = 1.4$. Hãy tính cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu khi từ độ sâu $2m$ xuống đến $20m$?

A. $e^{25.2}$ B. $e^{22.5}$ C. $e^{32.5}$ D. $e^{52.5}$

Câu 45. Để đo độ phóng xạ của một chất phóng xạ β^- người ta dùng máy đếm xung. Khi chất này phóng xạ ra các hạt β^- , các hạt này đập vào máy khi đó trong máy xuất hiện một xung điện và bộ đếm tăng thêm 1 đơn vị. Ban đầu máy đếm được 960 xung trong một phút nhưng sau đó 3h thì chỉ còn 120 xung trong một phút (trong cùng điều kiện). Hỏi chu kỳ bán rã của chất này là bao nhiêu giờ?

A. 1 giờ B. 2 giờ C. 0.5 giờ D. 1.5 giờ

Câu 46. Giả sử một hàm chi mức sản xuất của một hãng DVD trong một ngày là: $q(m, n) = m^{\frac{2}{3}} n^{\frac{1}{3}}$ trong đó m là số lượng nhân viên và n là số lao động chính. Mỗi ngày hãng phải sản xuất 40 sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng; biết rằng lương của nhân viên là 16\$ và lương của lao động chính là 27\$. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất chi phí một ngày của hãng sản xuất này.

A. 1440

B. 1340

C. 1240

D. 1540

Câu 47. Một tấm vải hình chữ nhật có chiều rộng là 1,2m; chiều dài là 350m và được cuộn chặt xung quanh một lõi gỗ hình trụ có đường kính 10cm liên tục cho đến hết, sao cho mép vải theo chiều rộng luôn song song với trục của hình trụ.

Cho biết độ dày của cuộn vải đó sau khi đã cuộn hết tấm vải, biết rằng tấm vải có độ dày như nhau là 0,15mm (kết quả tính theo xăng-ti-mét và làm tròn đến 3 chữ số thập phân)

A. 88.8 cm

B. 88,65 cm

C. 88,65cm hoặc 88.8cm

D. 87,65 cm.

Câu 48. Một hình vuông có cạnh bằng 100cm, người ta nối với nhau các trung điểm của 4 cạnh và lại được một hình vuông mới, lại làm như vậy đối với hình vuông mới và cứ tiếp tục làm như thế mãi. Tính tổng diện tích của n hình vuông đầu tiên?

A. $2 \cdot 100^2 \left(1 - \frac{1}{2^{99}}\right)$ B. $2 \cdot 100^2 \left(1 - \frac{1}{2^{98}}\right)$ C. $2 \cdot 100^2 \left(1 - \frac{1}{2^{100}}\right)$ D. $2 \cdot 100^2 \left(1 - \frac{1}{2^{97}}\right)$

C. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

I – ĐÁP ÁN 6.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	B	A	C	B	D	B	B	A	C	D	C	A	C	D	C	B	D	D

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	C	A	D	A	C	A	B	A	C	A	A	A	D	C	A	A	D	A	B

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	A	B	A	A	A	C	A												

II – HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. Ông An gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền a đồng, với lãi suất $r\%$ một tháng, theo phương thức lãi đơn. Hỏi sau n tháng ông An nhận được số tiền cả gốc và lãi được tính theo công thức nào?

- A. $a + nar$. B. nar . C. $a(1+r)^n$. D. $na(1+r)$.

Hướng dẫn giải

Đây là bài toán lãi đơn nên từ giả thiết ta có số tiền lãi là nar . Do đó, số tiền cả gốc và lãi là $a + nar$.

Đáp án: A.

Câu 2. Bà Mai gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank số tiền 50 triệu đồng với lãi suất $0,79\%$ một tháng, theo phương thức lãi kép. Tính số tiền cả vốn lẫn lãi bà Mai nhận được sau 2 năm? (làm tròn đến hàng nghìn)

- A. 60393000. B. 50793000. C. 50790000. D. 59480000.

Hướng dẫn giải

Đây là bài toán lãi kép với chu kỳ là một tháng, ta áp dụng công thức $A(1+r)^n$ với $A = 50$ triệu đồng, $r\% = 0,79\%$ và $n = 2.12 = 24$ tháng.

Đáp án: A.

Câu 3. Chị Hà gửi ngân hàng 3350000 đồng, theo phương thức lãi đơn, với lãi suất $0,4\%$ trên nửa năm. Hỏi ít nhất bao lâu chị rút được cả vốn lẫn lãi là 4020000 đồng?

- A. 5 năm. B. 30 tháng. C. 3 năm. D. 24 tháng.

Hướng dẫn giải

Gọi n là số chu kỳ gửi ngân hàng, áp dụng công thức lãi đơn ta có:

$$4020000 = 3350000(1 + n \cdot 0,04) \Rightarrow n = 5 \text{ (chu kỳ)}. \text{ Vậy thời gian là 30 tháng.}$$

Đáp án: B.

Câu 4. Tính theo phương thức lãi đơn, để sau 2,5 năm rút được cả vốn lẫn lãi số tiền là 10892000 đồng với lãi suất $\frac{5}{3}\%$ một quý thì bạn phải gửi tiết kiệm số tiền bao nhiêu?

- A. 9336000. B. 10456000. C. 617000. D. 2108000.

Hướng dẫn giải

Đây là bài toán lãi đơn với chu kỳ là một quý. Vậy 2,5 năm ứng với 10 chu kỳ. Với x là số tiền gửi tiết kiệm, ta có: $10892000 = x \left(1 + 10 \cdot \frac{5}{3 \cdot 100} \right) \Rightarrow x = 9336000$.

Đáp án: A.

Câu 5. Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng một số tiền là A đồng, với lãi suất $m\%$ một tháng. Nếu người này không rút tiền lãi ra thì cuối N tháng số tiền nhận được cả gốc và lãi được tính theo công thức nào?

- A. $A(1+m)^N$. B. $\frac{A}{m}[(1+m)^N - 1]$.
C. $\frac{A}{m}[(1+m)^{N+1} - (1+m)]$. D. $A + 2Am + \dots + Nam$.

Hướng dẫn giải

Đầu tháng thứ nhất gửi A (đồng) thì cuối tháng thứ N nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là $A(1+m)^N$ (đồng).

Đầu tháng thứ hai gửi A (đồng) thì cuối tháng thứ N nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là $A(1+m)^{N-1}$ (đồng).

Đầu tháng thứ N gửi A (đồng) thì cuối tháng thứ N nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là $A(1+m)$ (đồng).

Hàng tháng gửi A đồng thì cuối N tháng nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là

$$\begin{aligned} & A(1+m)^N + A(1+m)^{N-1} + \dots + A(1+m) \\ &= A \left[(1+m)^N + (1+m)^{N-1} + \dots + (1+m) \right] \\ &= A \frac{(1+m)^{N+1} - (1+m)}{m}. \end{aligned}$$

Đáp án: C.

Câu 6. Bạn Lan gửi 1500 USD với lãi suất đơn cố định theo quý. Sau 3 năm, số tiền bạn ấy nhận được cả gốc lẫn lãi là 2320 USD. Hỏi lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu một quý? (làm tròn đến hàng phần nghìn)

- A. 0,182 . B. 0,046 . C. 0,015 . D. 0,037 .

Hướng dẫn giải

Đây là bài toán lãi đơn, chu kỳ là một quý. Áp dụng công thức, ta có: $2320 = 1500(1 + 12r\%)$, bấm máy tính ta được lãi suất là $r\% \approx 0,046$ một quý.

Đáp án: B.

Câu 7. Chị Thanh gửi ngân hàng 155 triệu đồng, với lãi suất 1,02% một quý. Hỏi sau một năm số tiền lãi chị nhận được là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng nghìn)

- A. 161421000 . B. 6324000 . C. 1581000 . D. 6421000 .

Hướng dẫn giải

Số tiền lãi chính là tổng số tiền cả gốc lẫn lãi trừ đi số tiền gốc, nên ta có: tiền lãi là $155 \cdot (1 + 0,0102)^4 - 155 \approx 6421000$ (đồng).

Đáp án: D.

Câu 8. Hãy cho biết lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu một năm nếu bạn gửi 15,625 triệu đồng sau 3 năm rút được cả vốn lẫn lãi số tiền là 19,683 triệu đồng theo phương thức lãi kép?

- A. 9% . B. 8% . C. 0,75% . D. $\frac{2}{3}\%$.

Hướng dẫn giải

Gọi d là lãi suất cần tìm. Áp dụng công thức lãi kép, ta có:

$$19,683 = 15,625(1+d)^3 \Rightarrow d = 0,08 = 8\% .$$

Đáp án: B.

Câu 9. Một khách hàng gửi tiết kiệm 64 triệu đồng, với lãi suất 0,85% một tháng. Hỏi người đó phải mất ít nhất mấy tháng để được số tiền cả gốc lẫn lãi không dưới 72 triệu đồng?

- A. 13 . B. 14 . C. 15 . D. 18 .

Hướng dẫn giải

Gọi n là số tháng cần tìm, từ giả thiết ta có n là số tự nhiên nhỏ nhất thỏa

$$64(1 + 0,0085)^n > 72 \Leftrightarrow n > \log_{1,0085} \frac{72}{64} \approx 13,9 .$$

Đáp án: B.

Câu 10. Anh Thành trúng vé số giải thưởng 125 triệu đồng, sau khi trích ra 20% số tiền để chiêu đãi bạn bè và làm từ thiện, anh gửi số tiền còn lại vào ngân hàng với lãi suất 0,31% một tháng. Dự kiến 10 năm sau, anh rút tiền cả vốn lẫn lãi cho con gái vào đại học. Hỏi khi đó anh Thành rút được bao nhiêu tiền? (làm tròn đến hàng nghìn)

- A. 144980000 . B. 103144000 . C. 181225000 . D. 137200000 .

Hướng dẫn giải

Số tiền anh Thành gửi vào ngân hàng là $125.80\% = 100$ (triệu đồng).

Sau 10 năm là 120 tháng, số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi là: $100(1 + 0,0031)^{120} \approx 144980000$ (đồng).

Đáp án: A.

- Câu 11.** Bà An gửi tiết kiệm 53 triệu đồng theo kỳ hạn 3 tháng. Sau 2 năm, bà ấy nhận được số tiền cả gốc và lãi là 61 triệu đồng. Hỏi lãi suất ngân hàng là bao nhiêu một tháng (làm tròn đến hàng phần nghìn)? Biết rằng trong các tháng của kỳ hạn, chỉ cộng thêm lãi chứ không cộng vốn và lãi tháng trước để tính lãi tháng sau; hết một kỳ hạn lãi sẽ được cộng vào vốn để tính lãi trong đủ một kỳ hạn tiếp theo.

A. 0,018 . B. 0,073 . **C. 0,006 .** D. 0,019 .

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: $61 = 53(1 + r)^8$ ta được lãi suất một quý là $r\%$. Do đó, lãi suất một tháng là $r\% : 3 \approx 0,006$.

Đáp án: C.

- Câu 12.** Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng số tiền là 1000000 đồng, với lãi suất 0,8% một tháng. Sau một năm người ấy rút cả vốn và lãi để mua vàng thì số chỉ vàng mua được là bao nhiêu? Biết giá vàng là 3575000 / chỉ.

A. 5 . B. 4 . C. 6 . **D. 3 .**

Hướng dẫn giải

Đây là bài toán gửi tiết kiệm hàng tháng một số tiền như nhau.

Sau một năm số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi là $B = 10^6 \cdot \frac{1,008^{12} - 1,008}{0,008}$ (đồng).

Ta có: $B : 3575000 \approx 3,5$ nên số chỉ vàng có thể mua được là 3.

Đáp án: D.

- Câu 13.** Anh Bảo gửi 27 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép, kỳ hạn là một quý, với lãi suất 1,85% một quý. Hỏi thời gian nhanh nhất là bao lâu để anh Bảo có được ít nhất 36 triệu đồng tính cả vốn lẫn lãi?

A. 19 quý. B. 15 quý. **C. 4 năm.** D. 5 năm .

Hướng dẫn giải

Gọi n là số quý cần tìm, từ giả thiết ta có n là số tự nhiên nhỏ nhất thỏa $27(1 + 0,0185)^n > 36$.

Ta có: $n = 16$ quý, tức là 4 năm.

Đáp án: C.

- Câu 14.** Bà Tư gửi tiết kiệm 75 triệu đồng vào ngân hàng Agribank theo kỳ hạn 3 tháng và lãi suất 0,59% một tháng. Nếu bà không rút lãi ở tất cả các định kỳ thì sau 3 năm bà ấy nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu (làm tròn tới hàng nghìn)? Biết rằng trong các tháng của kỳ hạn, chỉ cộng thêm lãi chứ không cộng vốn và lãi tháng trước để tính lãi tháng sau; hết một kỳ hạn lãi sẽ được cộng vào vốn để tính lãi trong đủ một kỳ hạn tiếp theo.

A. 92576000 . B. 80486000 . C. 92690000 . D. 90930000 .

Hướng dẫn giải

Đây là bài toán lãi kép, chu kỳ một quý, với lãi suất $3.0,59\% = 1,77\%$ một quý.

Sau 3 năm là 12 quý, số tiền thu được cả gốc và lãi là $75(1 + 0,0177)^{12} \approx 92576000$ (đồng).

Đáp án: A.

- Câu 15.** Bạn muốn có 3000 USD để đi du lịch châu Âu. Để sau 4 năm thực hiện được ý định thì hàng tháng bạn phải gửi tiết kiệm bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị)? Biết lãi suất 0,83% một tháng.

A. 62 USD.

B. 61 USD.

D. 51 USD .

D. 42 USD.

Hướng dẫn giải

Gọi X (USD) là số tiền hàng tháng gửi tiết kiệm. Áp dụng công thức ta có:

$3000 = X \frac{1,0083^{49} - 1,0083}{0,0083}$, bấm máy tính ta được $X \approx 50,7$ (USD). Do đó, mỗi tháng phải gửi 51 USD.

Đáp án: D.

Câu 16. Chị Vân muốn mua một chiếc xe máy Sirius giá 25 triệu đồng. Nếu sau 3 năm trả hết nợ thì mỗi tháng chị phải gửi vào ngân hàng số tiền như nhau là bao nhiêu (làm tròn tới hàng nghìn)? Biết lãi suất 0,39% một tháng.

A. 603000.

B. 645000 .

C. 604000 .

D. 646000 .

Hướng dẫn giải

Gọi X (đồng) là số tiền hàng tháng gửi ngân hàng. Áp dụng công thức ta có:

$25.10^6 = X \frac{1,0039^{37} - 1,0039}{0,0039}$, bấm máy tính ta được $X \approx 646000$ (đồng).

Đáp án: D.

Câu 17. Một sinh viên muốn có 12 triệu đồng để mua laptop nên mỗi tháng gửi vào ngân hàng 250000 đồng với lãi suất 0,72% một tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng anh ta đủ tiền mua laptop?

A. 41 .

B. 36 .

C. 42 .

D. 37 .

Hướng dẫn giải

Gọi n là số tháng cần tìm. Áp dụng công thức ta có: $12 = 0,25 \frac{1,0072^{n+1} - 1,0072}{0,0072}$, bấm máy

tính ta được $n \approx 41,1$. Do đó, thời gian gửi tiết kiệm là 42 tháng.

Đáp án: C.

Câu 18. Ông Minh gửi vào ngân hàng G đồng, lãi suất $d\%$ một tháng theo phương thức lãi kép. Mỗi tháng ông rút ra X đồng vào ngày ngân hàng tính lãi. Hỏi sau n tháng số tiền còn lại được tính theo công thức nào sau đây:

A. $G(1+nd) - X \frac{(1+d)^n - 1}{d}$.B. $G(1+d)^n - X \frac{(1+d)^n - 1}{d}$.C. $G(1+d)^n - nX$.D. $(G - nX)d$.**Hướng dẫn giải**

Số tiền còn lại của ông M sau mỗi tháng định kỳ là như sau:

Sau tháng thứ nhất là $G(1+d) - X$.

Sau tháng thứ hai là $(G(1+d) - X)(1+d) - X = G(1+d)^2 - X[(1+d) + 1]$.

Sau tháng thứ ba là

$(G(1+d)^2 - X((1+d) + 1))(1+d) - X = G(1+d)^3 - X[(1+d)^2 + (1+d) + 1]$.

Theo giả thiết quy nạp, sau tháng thứ n là

$G(1+d)^n - X[(1+d)^{n-1} + \dots + (1+d) + 1] = G(1+d)^n - X \frac{(1+d)^n - 1}{d}$

Đáp án: B.

Câu 19. Một khách hàng gửi ngân hàng 20 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng, với lãi suất 0,65% một tháng theo phương thức lãi kép. Hỏi sau bao lâu vị khách này mới có số tiền lãi nhiều hơn số tiền gốc ban đầu gửi ngân hàng? Giả sử người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ.

A. 8 năm 11 tháng.

B. 19 tháng.

C. 18 tháng.

D. 9 năm.

Hướng dẫn giải

Lãi suất theo kỳ hạn 3 tháng là $3.0,65\% = 1,95\%$

Gọi n là số kỳ hạn cần tìm. Theo giả thiết ta có n là số tự nhiên nhỏ nhất thỏa

$20(1 + 0,0195)^n - 20 > 20$. Ta được $n = 36$ chu kỳ, một chu kỳ là 3 tháng, nên thời gian cần tìm là 108 tháng, tức là 9 năm.

Đáp án: D.

- Câu 20.** Một người vay ngân hàng số tiền 350 triệu đồng, mỗi tháng trả góp 8 triệu đồng và lãi suất cho số tiền chưa trả là 0,79% một tháng. Kỳ trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất. Hỏi số tiền phải trả ở kỳ cuối là bao nhiêu để người này hết nợ ngân hàng? (làm tròn đến hàng nghìn)
- A. 2921000. B. 7084000. C. 2944000. D. 7140000.

Hướng dẫn giải

Kỳ trả đầu tiên là cuối tháng thứ nhất nên đây là bài toán vay vốn trả góp cuối kỳ.

Gọi A là số tiền vay ngân hàng, B là số tiền trả trong mỗi chu kỳ, $d = r\%$ là lãi suất cho số tiền chưa trả trên một chu kỳ, n là số kỳ trả nợ.

Số tiền còn nợ ngân hàng (tính cả lãi) trong từng chu kỳ như sau:

+ Đầu kỳ thứ nhất là A .

+ Cuối kỳ thứ nhất là $A(1+d) - B$.

+ Cuối kỳ thứ hai là $(A(1+d) - B)(1+d) - B = A(1+d)^2 - B[(1+d) + 1]$.

+ Cuối kỳ thứ ba là $[A(1+d)^2 - B((1+d) + 1)](1+d) - B = A(1+d)^3 - B[(1+d)^2 + (1+d) + 1]$.

.....

+ Theo giả thiết quy nạp, cuối kỳ thứ n là

$$A(1+d)^n - B[(1+d)^{n-1} + \dots + (1+d) + 1] = A(1+d)^n - B \frac{(1+d)^n - 1}{d}$$

Vậy số tiền còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ là $A(1+d)^n - B \frac{(1+d)^n - 1}{d}$.

Trở lại bài toán, gọi n (tháng) là số kỳ trả hết nợ.

Khi đó, ta có: $A(1+d)^n - B \frac{(1+d)^n - 1}{d} = 0 \Leftrightarrow 350.1,0079^n - 8 \cdot \frac{1,0079^n - 1}{0,0079} = 0 \Leftrightarrow n \approx 53,9$.

Tức là phải mất 54 tháng người này mới trả hết nợ.

Cuối tháng thứ 53, số tiền còn nợ (tính cả lãi) là $S_{53} = 350.1,0079^{53} - 8 \cdot \frac{1,0079^{53} - 1}{0,0079}$ (triệu đồng).

Kỳ trả nợ tiếp theo là cuối tháng thứ 54, khi đó phải trả số tiền S_{53} và lãi của số tiền này nữa là $S_{53} + 0,0079.S_{53} = S_{53}.1,0079 \approx 7,139832$ (triệu đồng).

Đáp án: D.

- Câu 21.** Tính đến đầu năm 2011, dân số toàn tỉnh Bình Phước đạt gần 905.300, mức tăng dân số là 1,37% mỗi năm. Dân số tỉnh Bình Phước đến hết năm 2025 là
- A. 1050761. B. 1110284. C. 1095279. D. 1078936.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: $S_n = A(1+r)^n$

Trong đó: $A = 905.300, r = 1,37; n = 15$

Ta được dân số đến hết năm 2025 là: 1110284,349.

Đáp án: B.

- Câu 22.** Tính đến đầu năm 2011, dân số toàn tỉnh Bình Phước đạt gần 905.300, mức tăng dân số là 1,37% mỗi năm. Tỉnh thực hiện tốt chủ trương 100% trẻ em đúng độ tuổi đều vào lớp 1. Đến năm học 2024-2025 ngành giáo dục của tỉnh cần chuẩn bị bao nhiêu phòng học cho học sinh lớp 1, mỗi phòng dành cho 35 học sinh? (Giả sử trong năm sinh của lứa học sinh vào lớp 1 đó toàn tỉnh có 2400 người chết, số trẻ tử vong trước 6 tuổi không đáng kể)
- A.458. B.222. **C. 459.** D. 221.

Hướng dẫn giải

Chỉ những em sinh năm 2018 mới đủ tuổi đi học (6 tuổi) vào lớp 1 năm học 2024-2025.

Áp dụng công thức $S_n = A(1+r)^n$ để tính dân số năm 2018.

Trong đó: $A = 905300; r = 1,37; n = 8$

$$\text{Dân số năm 2018 là: } A = 905300 \cdot \left(1 + \frac{1,37}{100}\right)^8 = 1009411$$

$$\text{Dân số năm 2017 là: } A = 905300 \cdot \left(1 + \frac{1,37}{100}\right)^7 = 995769$$

$$\text{Số trẻ vào lớp 1 là: } 1009411 - 995769 + 2400 = 16042$$

$$\text{Số phòng học cần chuẩn bị là : } 16042 : 35 = 458,3428571.$$

Đáp án: C.

- Câu 23.** Tính đến đầu năm 2011, toàn tỉnh Bình Dương có 1.691.400 người, đến đầu năm 2015 dân số của tỉnh Bình Dương sẽ là 1.802.500 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của tỉnh Bình Dương tăng bao nhiêu phần trăm?
- A. 1,6%.** B.1,3%. C.1,2%. D.16,4%.

Hướng dẫn giải

$$\text{Áp dụng công thức: } r\% = \sqrt[n]{\frac{S_n}{A}} - 1$$

Trong đó: $A = 1.691.400; S_n = 1.802.500; n = 4$ ta được 0,01603...

Đáp án: A.

- Câu 24.** Dân số thế giới cuối năm 2010, ước tính 7 tỉ người. Hỏi với mức tăng trưởng 1,5% mỗi năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm nữa dân số thế giới sẽ lên đến 10 tỉ người?
- A.29. B.23. C.28. **D.24.**

Hướng dẫn giải

$$\text{Áp dụng công thức: } n = \log_{(1+r)} \left(\frac{S_n}{A} \right)$$

$$\text{Trong đó: } A = 7; S_n = 10; r = 1,5\% = \frac{1,5}{100}$$

Ta được $n = 23,95622454$.

Đáp án: D.

- Câu 25.** Dân số thế giới cuối năm 2010, ước tính 7 tỉ người. Hỏi với mức tăng trưởng dân số 1,5% mỗi năm thì cuối năm 2020 dân số thế giới là bao nhiêu?
- A.8,12 tỉ người.** B.8,05 tỉ người.
C.8 tỉ người. D.8,10 tỉ người.

Hướng dẫn giải

$$\text{Áp dụng công thức: } S_n = A(1+r)^n$$

Trong đó: $A = 7, r = 1,5; n = 10$

Ta được dân số đến hết năm 2020 là: 8,123785775.

Đáp án: A.

Câu 26. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm ở Việt Nam được duy trì ở mức 1,05%. Theo số liệu của Tổng Cục Thống Kê, dân số của Việt Nam năm 2014 là 90.728.900 người. Với tốc độ tăng dân số như thế thì vào năm 2030, dân số của Việt Nam là:

A. 106.118.331 người.

B. 198.049.810 người.

C. 107.232.574 người.

D. 108.358.516 người.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: $S_n = A(1+r)^n$

Trong đó: $A = 90.728.900, r = 1,05; n = 16$

Ta được dân số đến hết năm 2030 là: 107.232.574.

Đáp án: C.

Câu 27. Tới cuối năm 2013, dân số Nhật Bản đã giảm 0,17% xuống còn 127.298.000 người. Hỏi với tốc độ giảm dân số như vậy thì đến cuối năm 2023 dân số Nhật Bản còn bao nhiêu người?

A. 125.150.414 người.

B. 125.363.532 người.

C. 125.154.031 người.

D. 124.937.658 người.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: $S_n = A(1+r)^n$

Trong đó: $A = 127.298.000, r = 0,17; n = 10$

Ta được dân số đến cuối năm 2023 là: 125150414.

Đáp án: A.

Câu 28. Một huyện A có 100 000 dân. Với mức tăng dân số bình quân 1,5% năm thì sau n năm dân số sẽ vượt 130 000 dân. Hỏi n nhỏ nhất bao nhiêu?

A. 17.

B. 18.

C. 19.

D. 16.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: $n = \log_{(1+r)} \left(\frac{S_n}{A} \right)$

Trong đó: $A = 100.000, r = 1,5; S_n = 130.000$

Ta được: 17,62180758.

Đáp án: B.

Câu 29. Một huyện A có 100 000 dân. Với mức tăng dân số bình quân 1,8% năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm nữa dân số sẽ vượt 150 000 dân.

A. 23.

B. 22.

C. 27.

D. 28.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: $n = \log_{(1+r)} \left(\frac{S_n}{A} \right)$

Trong đó: $A = 100.000, r = 1,8; S_n = 150.000$

Ta được: 22,72796911.

Đáp án: A.

Câu 30. Chú Việt gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi suất 5%/năm. Tiền lãi năm trước được cộng dồn vào tiền gốc để tính tiền lãi năm sau. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì chú Việt thu được gấp đôi số tiền đã gửi?

A. 16.

B. 14.

C. 15.

D. 20.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: $n = \log_{(1+r)} \left(\frac{S_n}{A} \right)$

Trong đó: $A = 10, r = 5; S_n = 20$

Ta được: 14,20669908.

Đáp án: C.

Câu 31. Hàng tháng, một người gửi tiết kiệm ngân hàng số tiền 20000000 đồng với lãi suất cố định 0.6%/tháng. Hỏi sau 5 năm, người đó có tổng số tiền (gồm tiền gốc đã gửi và tiền lãi) là bao nhiêu. Biết rằng trong quá trình gửi người đó không rút tiền lãi và lãi suất không thay đổi.

A. $2000000(1+0.006) \frac{(1.006)^{60} - 1}{0.006}$

B. $2000000(1.06) \frac{(1.06)^{60} - 1}{0.06}$

C. $2000000(1.6) \frac{(1.6)^{60} - 1}{0.6}$

D. $2000000(1.0006) \frac{(1.0006)^{60} - 1}{0.0006}$

Hướng dẫn giải

Đáp án: A

VẬN DỤNG (tối thiểu 10 câu)

Câu 32. Chú Tư gửi vào ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất 0,6%/tháng. Sau mỗi tháng, chú Tư đến ngân hàng rút mỗi tháng 3 triệu đồng để chi tiêu cho đến khi hết tiền thì thôi. Sau một số tròn tháng thì chú Tư rút hết tiền cả gốc lẫn lãi. Biết trong suốt thời gian đó, ngoài số tiền rút mỗi tháng chú Tư không rút thêm một đồng nào kể cả gốc lẫn lãi và lãi suất không đổi. Vậy tháng cuối cùng chú Tư sẽ rút được số tiền là bao nhiêu (làm tròn đến đồng)?

A. 1840270 đồng.

B. 3000000 đồng.

C. 1840269 đồng.

D. 1840268 đồng.

Hướng dẫn giải

[Phương pháp tự luận]

Áp dụng công thức tính số tiền còn lại sau n tháng
$$S_n = A(1+r)^n - X \frac{(1+r)^n - 1}{r}$$

Với $A = 50$ triệu đồng, $r = 0,6$ và $X = 3$ triệu đồng ta được $S_n = 50.1,006^n - 3. \frac{1,006^n - 1}{0,006}$.

Để rút hết số tiền thì ta tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho

$$S_n < 0 \Leftrightarrow 50.1,006^n - 3. \frac{1,006^n - 1}{0,006} < 0 \Leftrightarrow 500 - 450.1,006^n < 0 \Leftrightarrow n > \log_{1,006} \frac{500}{450} \Rightarrow n = 18$$

Khi đó số tiền tháng cuối cùng mà chú Tư rút là

$$S_{17}.1,006 = \left[50.1,006^{17} - 3. \frac{1,006^{17} - 1}{0,006} \right].1,006 \approx 1,840269833 \text{ triệu đồng} \approx 1840270 \text{ đồng}$$

[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập lên màn hình máy tính $50.1,006^x - 3. \frac{1,006^x - 1}{0,006}$, tính giá trị chạy từ 10 đến 20 với step

bằng 1 ta được bảng giá trị tương ứng và số tiền còn lại nhỏ hơn 3 ứng với $X = 17$.

Từ đó tính được số tiền rút ra ở tháng cuối cùng là

$$S_{17}.1,006 = \left[50.1,006^{17} - 3. \frac{1,006^{17} - 1}{0,006} \right].1,006 \approx 1,840269833 \text{ triệu đồng} \approx 1840270 \text{ đồng}$$

Câu 33. Ông Năm gửi 320 triệu đồng ở hai ngân hàng X và Y theo phương thức lãi kép. Số tiền thứ nhất gửi ở ngân hàng X với lãi suất 2,1% một quý trong thời gian 15 tháng. Số tiền còn lại gửi ở ngân hàng Y với lãi suất 0,73% một tháng trong thời gian 9 tháng. Tổng lợi tức đạt được ở

hai ngân hàng là 27507768,13 (chưa làm tròn). Hỏi số tiền ông Năm lần lượt gửi ở ngân hàng X và Y là bao nhiêu?

- A. 140 triệu và 180 triệu.
C. 200 triệu và 120 triệu.

- B. 180 triệu và 140 triệu.
D. 120 triệu và 200 triệu.

Hướng dẫn giải

Tổng số tiền cả vốn và lãi (lãi chính là lợi tức) ông Năm nhận được từ cả hai ngân hàng là 347,50776813 triệu đồng.

Gọi x (triệu đồng) là số tiền gửi ở ngân hàng X, khi đó $320 - x$ (triệu đồng) là số tiền gửi ở ngân hàng Y. Theo giả thiết ta có: $x(1 + 0,021)^5 + (320 - x)(1 + 0,0073)^9 = 347,50776813$

Ta được $x = 140$. Vậy ông Năm gửi 140 triệu ở ngân hàng X và 180 triệu ở ngân hàng Y.

Đáp án: A.

Câu 34. Anh Bình vay ngân hàng 2 tỷ đồng để xây nhà và trả dần mỗi năm 500 triệu đồng. Kỳ trả đầu tiên là sau khi nhận vốn với lãi suất trả chậm 9% một năm. Hỏi sau mấy năm anh Bình mới trả hết nợ đã vay?

- A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

Hướng dẫn giải

Kỳ trả nợ đầu tiên là sau khi nhận vốn nên đây là bài toán vay vốn trả góp đầu kỳ.

Gọi A là số tiền vay ngân hàng, B là số tiền trả trong mỗi chu kỳ, $d = r\%$ là lãi suất trả chậm (tức là lãi suất cho số tiền còn nợ ngân hàng) trên một chu kỳ, n là số kỳ trả nợ.

Số tiền còn nợ ngân hàng (tính cả lãi) trong từng chu kỳ như sau:

+ Đầu kỳ thứ nhất là $A - B$.

+ Đầu kỳ thứ hai là $(A - B)(1 + d) - B = A(1 + d) - B[(1 + d) + 1]$.

+ Đầu kỳ thứ ba là $[A(1 + d) - B((1 + d) + 1)](1 + d) - B = A(1 + d)^2 - B[(1 + d)^2 + (1 + d) + 1]$.

.....

+ Theo giả thiết quy nạp, đầu kỳ thứ n là

$$A(1 + d)^{n-1} - B[(1 + d)^{n-1} + \dots + (1 + d) + 1] = A(1 + d)^{n-1} - B \frac{(1 + d)^n - 1}{d}$$

Vậy số tiền còn nợ (tính cả lãi) sau n chu kỳ là $A(1 + d)^{n-1} - B \frac{(1 + d)^n - 1}{d}$.

Trở lại bài toán, để sau n năm (chu kỳ ở đây ứng với một năm) anh Bình trả hết nợ thì ta có

$$A(1 + d)^{n-1} - B \frac{(1 + d)^n - 1}{d} = 0 \Leftrightarrow 2,1,09^{n-1} - 0,5 \cdot \frac{1,09^n - 1}{0,09} = 0 \Leftrightarrow n \approx 4,7.$$

Vậy phải sau 5 năm anh Bình mới trả hết nợ đã vay.

Đáp án: D.

Câu 35. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của một số ngân hàng hiện nay là 8,2% một năm đối với kỳ hạn một năm. Để khuyến mãi, ngân hàng A đưa ra dịch vụ mới như sau: nếu khách hàng gửi tiết kiệm năm đầu thì lãi suất là 8,2% một năm; sau đó, lãi suất năm sau hơn lãi suất năm trước đó là 0,12%. Hỏi nếu gửi 1,5 triệu đồng theo dịch vụ đó thì sau 7 năm số tiền sẽ nhận được cả gốc và lãi là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị)

- A. 2 609 233. B. 2 665 464. C. 2 665 463. D. 2 609 234.

Hướng dẫn giải

Ta nhập vào MTCT như sau:

Thiết lập: 1500000 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{RCL}} A$, 0,082 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{RCL}} B$; 0 $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{RCL}} D$ (biến đếm).

Phép lặp: $D = D + 1$; $A = A \times (1 + B)$; $B = B + 0,0012$.

Bấm CALC = = = ..., đến khi $D = 7$ ta được $A = 2 665 463,087$

Đáp án: C.

- Câu 36.** Theo chính sách tín dụng của chính phủ hỗ trợ sinh viên vay vốn trang trải học tập: mỗi sinh viên được vay tối đa 900000 đồng/ tháng (9 triệu/ năm học), với lãi suất 0,45% một tháng. Mỗi năm lập thủ tục vay 2 lần ứng với 2 học kỳ và được nhận tiền vay đầu mỗi học kỳ (mỗi lần nhận tiền vay là 4,5 triệu). Giả sử sinh viên A trong thời gian học đại học 5 năm vay tối đa theo chính sách thì tổng số tiền nợ bao gồm cả lãi là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị)
- A. 52343156 B. 52343155 C. 46128921 D. 96128922

Hướng dẫn giải

Sau 5 năm học đại học tức là 10 học kỳ, ta nhập vào MTCT như sau:

Thiết lập: 0[SHIFT][RCL]A, 0[SHIFT][RCL]D (biến đếm).

Phép lặp: $D = D + 1 : A = (A + 4500000) \times 1,0045^6$.

Bấm CALC = = = ..., đến khi $D = 10$ ta được $A = 52343155,61$

Đáp án: A.

- Câu 37.** Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng khoảng tiền cố định với lãi suất 0.6%/tháng và lãi suất hàng tháng được nhập vào vốn. Hỏi sau bao lâu thì người đó thu được số tiền gấp hơn ba ban đầu?
- A. 184 tháng B. 183 tháng C. 186 tháng D. 185 tháng

Hướng dẫn giải

$$T_n = 3T_0 \Leftrightarrow 3T_0 = T_0(1+r)^n \Leftrightarrow n = \log_{(1+r)} 3$$

Đáp án: A.

- Câu 38.** Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu $mmHg$) suy giảm mũ so với độ cao x (đo bằng mét), tức là P giảm theo công thức: $P = P_0 e^{xi}$, trong đó $P_0 = 760mmHg$ là áp suất ở mực nước biển ($x = 0$), i là hệ số suy giảm. Biết rằng, ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 672.72 $mmHg$. Hỏi áp suất của không khí ở độ cao 12km bằng bao nhiêu? (các kết quả giữ lại sau dấu thập phân 7 chữ số)
- A. 178,8176855 B. 176,8176855 C. 177,8176855 D. 175,8176855

Hướng dẫn giải

$$\text{Khi ở độ cao } 1000m: i = \frac{1}{1000} \ln \frac{672,72}{760}$$

Đáp án: D.

- Câu 39.** Áp suất không khí P (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu $mmHg$) suy giảm mũ so với độ cao x (đo bằng mét), tức là P giảm theo công thức: $P = P_0 e^{xi}$, trong đó $P_0 = 760mmHg$ là áp suất ở mực nước biển ($x = 0$), i là hệ số suy giảm. Biết rằng, ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 672.72 $mmHg$. Ở Mỹ, những người có thể lên đến độ cao 80.2 km được xem là những nhà du hành vũ trụ, hỏi áp suất không khí ở độ cao 80.2km là bao nhiêu? (các kết quả giữ lại sau dấu thập phân 9 chữ số)
- A. 0.042842767 B. 0.052842767 C. 0.062842767 D. 0.032842767

Hướng dẫn giải

$$\text{Khi ở độ cao } 12km: P_{12} = 760e^{\frac{12000}{1000} \ln \frac{672,72}{760}}$$

Đáp án: A.

- Câu 40.** Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức: $m(t) = m_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{T}}$, trong đó m_0 là khối lượng ban đầu của chất phóng xạ (tại thời điểm $t = 0$); T là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa khối lượng chất phóng xạ bị biến thành chất khác). Chu kì

bán rã của Cabon ^{14}C là khoảng 5730 năm. Cho trước mẫu Cabon có khối lượng 100g. Hỏi sau khoảng thời gian t thì khối lượng còn bao nhiêu?

A. $m(t) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{5730t}{5730}}$ B. $m(t) = 100 \cdot e^{\frac{t \ln 2}{5730}}$ C. $m(t) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{100t}{5730}}$ D. $m(t) = 100 \cdot e^{\frac{100t}{5730}}$

Hướng dẫn giải

Theo công thức $m(t) = m_0 e^{-kt}$ ta có:

$$m(5730) = \frac{100}{2} = 50 = 100 \cdot e^{-k \cdot 5730} \Leftrightarrow k = \frac{\ln 2}{5730} \text{ suy ra } m(t) = 100 e^{\frac{-\ln 2}{5730} t}$$

Đáp án: B.

- Câu 41.** Trong vật lí, sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn bởi công thức: $m(t) = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$, trong đó m_0 là khối lượng ban đầu của chất phóng xạ (tại thời điểm $t = 0$); T là chu kì bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa khối lượng chất phóng xạ bị biến thành chất khác). Chu kì bán rã của Cabon ^{14}C là khoảng 5730 năm. Người ta tìm được trong một mẫu đồ cổ một lượng Cabon và xác định được nó đã mất khoảng 25% lượng Cabon ban đầu của nó. Hỏi mẫu đồ cổ đó có tuổi là bao nhiêu?

A. 2400 năm B. 2300 năm C. 2387 năm D. 2378 năm

Hướng dẫn giải

Giả sử khối lượng ban đầu của mẫu đồ cổ chứa Cabon là m_0 , tại thời điểm t tính từ thời điểm ban đầu ta có:

$$m(t) = m_0 e^{\frac{-\ln 2}{5730} t} \Leftrightarrow \frac{3m_0}{4} = m_0 e^{\frac{-\ln 2}{5730} t} \Leftrightarrow t = \frac{5730 \ln \left(\frac{3}{4}\right)}{-\ln 2} \approx 2378 (\text{năm})$$

Đáp án: D.

- Câu 42.** Một nghiên cứu cho thấy một nhóm học sinh được cho xem cùng một danh sách các loài động vật và được kiểm tra lại xem họ nhớ bao nhiêu % mỗi tháng. Sau t tháng, khả năng nhớ trung bình của nhóm học sinh được cho bởi công thức $M(t) = 75 - 20 \ln(t+1)$, $t \geq 0$ (đơn vị %). Hỏi sau khoảng bao lâu thì nhóm học sinh nhớ được danh sách đó dưới 10%?

A. 25 tháng B. 23 tháng C. 24 tháng D. 22 tháng

Hướng dẫn giải

Theo công thức tính tỉ lệ % thì cần tìm t thỏa mãn:

$$75 - 20 \ln(1+t) \leq 10 \Leftrightarrow \ln(t+1) \geq 3.25 \Leftrightarrow t \geq 24.79$$

Đáp án: A.

- Câu 43.** Một công ty vừa tung ra thị trường sản phẩm mới và họ tổ chức quảng cáo trên truyền hình mỗi ngày. Một nghiên cứu thị trường cho thấy, nếu sau x quảng cáo được phát thì số % người xem mua sản phẩm là $P(x) = \frac{100}{1 + 49e^{-0.015x}}$, $x \geq 0$. Hãy tính số quảng cáo được phát tối thiểu để số người mua đạt hơn 75%.

A. 343 B. 333 C. 330 D. 323

Hướng dẫn giải

Số quảng cáo phát ra tối thiểu để số người mua đạt hơn 75%

$$75\% \leq \frac{100}{1 + 49e^{-0.015x}} \Rightarrow x \geq 333$$

Đáp án: B.

Câu 44. Cường độ ánh sáng đi qua môi trường khác không khí (chẳng hạn sương mù, nước,...) sẽ giảm dần tùy thuộc độ dày của môi trường và hằng số μ gọi là khả năng hấp thụ của môi trường, tùy thuộc môi trường thì khả năng hấp thụ tính theo công thức $I = I_0 e^{-\mu x}$ với x là độ dày của môi trường đó và được tính bằng đơn vị mét. Biết rằng nước biển có $\mu = 1.4$. Hãy tính cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu khi từ độ sâu $2m$ xuống đến $20m$?

A. $e^{25.2}$

B. $e^{22.5}$

C. $e^{32.5}$

D. $e^{52.5}$

Hướng dẫn giải

Cường độ ánh sáng thay đổi khi đi từ độ sâu x_1 đến độ sâu x_2 là:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{I_0 e^{-\mu x_1}}{I_0 e^{-\mu x_2}} = e^{\mu(x_2 - x_1)}$$

Đáp án: A.

Câu 45. Để đo độ phóng xạ của một chất phóng xạ β^- người ta dùng máy đếm xung. Khi chất này phóng xạ ra các hạt β^- , các hạt này đập vào máy khi đó trong máy xuất hiện một xung điện và bộ đếm tăng thêm 1 đơn vị. Ban đầu máy đếm được 960 xung trong một phút nhưng sau đó 3h thì chỉ còn 120 xung trong một phút (trong cùng điều kiện). Hỏi chu kỳ bán rã của chất này là bao nhiêu giờ?

A. 1 giờ

B. 2 giờ

C. 0.5 giờ

D. 1.5 giờ

Hướng dẫn giải

Gọi ΔN_1 là số hạt β^- được phóng ra trong khoảng thời gian Δt_1 kể từ thời điểm ban đầu. Ta có:

$$\Delta N_1 = N_{01} - N_1 = N_{01} (1 - e^{-k\Delta t_1}) \quad (N_{01} \text{ là số hạt phóng xạ } \beta^- \text{ ban đầu})$$

Sau 3 giờ số nguyên tử còn lại trong chất phóng xạ là: $N_{02} = N_{01} e^{-3k}$

Kể từ thời điểm này, trong khoảng thời gian Δt_2 thì số hạt β^- tạo thành là:

$$\Delta N_2 = N_{02} - N_2 = N_{02} (1 - e^{-k\Delta t_2})$$

Cho $\Delta t_1 = \Delta t_2 = 1$ phút thì: $\Delta N_1 = 960, \Delta N_2 = 120$ suy ra:

$$\frac{\Delta N_1}{\Delta N_2} = \frac{N_{01} (1 - e^{-k\Delta t_1})}{N_{01} e^{-3k} (1 - e^{-k\Delta t_2})} \Leftrightarrow \frac{960}{120} = e^{3k} \Leftrightarrow \ln 8 = 3 \frac{\ln 2}{T} \Leftrightarrow T = 1$$

Đáp án: A.

Câu 46. Giả sử một hàm chỉ mức sản xuất của một hãng DVD trong một ngày là: $q(m, n) = m^{\frac{2}{3}} n^{\frac{1}{3}}$ trong đó m là số lượng nhân viên và n là số lao động chính. Mỗi ngày hãng phải sản xuất 40 sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng; biết rằng lương của nhân viên là 16\$ và lương của lao động chính là 27\$. Hãy tìm giá trị nhỏ nhất chi phí một ngày của hãng sản xuất này.

A. 1440

B. 1340

C. 1240

D. 1540

Hướng dẫn giải

Theo giả thiết, chi phí mỗi ngày là: $C = 16m + 27n$

Do hàm sản xuất mỗi ngày phải đạt chỉ tiêu 40 sản phẩm nên cần có:

$$m^{\frac{2}{3}} n^{\frac{1}{3}} \geq 40 \Leftrightarrow n \geq \frac{40^3}{m^2}$$

Mối quan hệ giữa số lượng nhân viên và chi phí kinh doanh là: $C \geq 16m + \frac{27 \cdot 40^3}{m^2}$

Theo bất đẳng thức AM-GM thì:

$$16m + \frac{27.40^3}{m^2} = 8m + 8m + \frac{27.40^3}{m^2} \geq 3\sqrt[3]{\frac{8m.8m.27.40^3}{m^2}} = 1440$$

Do đó, chi phí thấp nhất cần tìm là: $\min C = 1440$ (USD) khi $8m = \frac{27.40^3}{m^2} \Leftrightarrow m = 60$, tức là số nhân viên bằng 60 và lao động chính sắp xỉ 18 người (do $n = \frac{40^3}{60^2} \approx 17.778 \approx 18$)

Đáp án: A.

Câu 47. Một tấm vải hình chữ nhật có chiều rộng là 1,2m; chiều dài là 350m và được cuộn chặt xung quanh một lõi gỗ hình trụ có đường kính 10cm liên tục cho đến hết, sao cho mép vải theo chiều rộng luôn song song với trục của hình trụ.

Cho biết độ dày của cuộn vải đó sau khi đã cuộn hết tấm vải, biết rằng tấm vải có độ dày như nhau là 0,15mm (kết quả tính theo xăng-ti-mét và làm tròn đến 3 chữ số thập phân)

A. 88.8 cm

B. 88,65 cm

C. 88,65cm hoặc 88.8cm

D. 87,65 cm.

Hướng dẫn giải

Gọi $d = 10$ cm = 100 mm là đường kính của lõi gỗ hình trụ; $b = 0,15$ mm là độ dày của tấm vải.

Vòng vải thứ nhất (quấn đủ vòng) có chiều dài: $u_1 = \pi d$

Vòng vải thứ hai (quấn đủ vòng) có chiều dài: $u_2 = \pi(d + 2b)$

Vòng vải thứ ba (quấn đủ vòng) có chiều dài: $u_3 = \pi(d + 4b)$

...

Vòng vải thứ n (quấn đủ vòng) có chiều dài: $u_n = \pi(d + 2(n-1)b)$

Do đó, nếu quấn đủ n vòng quanh lõi gỗ thì chiều dài tấm vải là:

$$S = \pi \left[nd + 2b(1 + 2 + 3 + \dots + (n-1)) \right] = \pi \left[nd + 2b \times \frac{n(n-1)}{2} \right] = \pi (bn^2 + (d-b)n)$$

Theo giả thiết: $s = 350000 \Leftrightarrow \pi bn^2 + \pi(d-b)n - 350000 = 0$

Giải phương trình bậc hai trên ta được: $n_1 \approx 591,0178969$; $n_2 \approx -1256,684564 < 0$ (loại).

Do đó khi quấn tấm vải trên quanh lõi gỗ ta được quá 591 vòng và thêm chưa đủ một vòng.

Suy ra độ dày của cuộn vải là: 88,65 cm hoặc 88.8 cm

Đáp án: C.

Câu 48. Một hình vuông có cạnh bằng 100cm, người ta nối với nhau các trung điểm của 4 cạnh và lại được một hình vuông mới, lại làm như vậy đối với hình vuông mới và cứ tiếp tục làm như thế mãi. Tính tổng diện tích của n hình vuông đầu tiên?

A. $2.100^2 \left(1 - \frac{1}{2^{99}}\right)$

B. $2.100^2 \left(1 - \frac{1}{2^{98}}\right)$

C. $2.100^2 \left(1 - \frac{1}{2^{100}}\right)$

D. $2.100^2 \left(1 - \frac{1}{2^{97}}\right)$

Hướng dẫn:

Giả sử hình vuông cạnh a , và T_n là diện tích hình vuông thứ n .

$$T_1 = a^2, T_2 = \frac{1}{2}T_1, T_3 = \frac{1}{2}T_2 = \frac{1}{2^2}T_1, \dots, T_n = \frac{1}{2^{n-1}}T_1$$

Tổng diện tích các hình vuông:

$$S_n = T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_n = T_1 \left(\frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} \right) = 2a^2 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right)$$

