




Nơi khởi đầu vóc mơ
TUYỂN TẬP LƯỢNG GIÁC
(ĐÁP ÁN CHI TIẾT)
BIÊN SOẠN: LUU HUY THUỐNG

Toàn bộ tài liệu của thầy ở trang:
<http://www.Luuuythuong.blogspot.com>



HỌ VÀ TÊN:

LỚP :.....

TRƯỜNG :.....

HÀ NỘI, 4/2014

TUYỂN TẬP LƯỢNG GIÁC

Toàn bộ tài liệu luyện thi đại học môn toán của thầy Lưu Huy Thưởng:

<http://www.LuuHuyThuong.blogspot.com>

HT 1. Giải các phương trình:

1) $2\cos^2 x + \sqrt{3}\cos x = 0$

2) $\sin^2 x + \sin 2x + 2\cos^2 x = 2$

3) $3\sin^2 x + \sin 2x + \cos^2 x = 3$

4) $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

5) $\cos 2x + 3\sin x - 2 = 0$

6) $2\cos 2x - 3\cos x + 1 = 0$

Bài giải

1) $2\cos^2 x + \sqrt{3}\cos x = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \pm\frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

2) $\sin^2 x + \sin 2x + 2\cos^2 x = 2$

$$\Leftrightarrow \sin x(2\cos x - \sin x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \\ \tan x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k\pi \\ x = \arctan 2 + k\pi \end{cases}$$

3) $3\sin^2 x + \sin 2x + \cos^2 x = 3$

$$\Leftrightarrow 2\sin x \cos x - 2\cos^2 x = 0 \Leftrightarrow 2\cos x(\sin x - \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \tan x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}$$

$$4) 2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$$

5) $\cos 2x + 3\sin x - 2 = 0$

$$\Leftrightarrow 1 - 2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0 \Leftrightarrow 2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$$

$$6) 2\cos 2x - 3\cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow 4\cos^2 x - 3\cos x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \cos x = -\frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = \pm \arccos(-\frac{1}{4}) + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

HT 2. Giải các phương trình sau:

1) $\sqrt{3}\sin 3x - \cos 3x = 2$

2) $\sin 5x + \cos 5x = -\sqrt{2}$

3) $\sqrt{3}\sin x + \cos x = \sqrt{2}$

4) $\sqrt{3}\sin x - \cos x = \sqrt{2}$

Bài giải

1) $\sqrt{3}\sin 3x - \cos 3x = 2$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 3x - \frac{1}{2}\cos 3x = 1 \Leftrightarrow \sin(3x - \frac{\pi}{6}) = 1 \Leftrightarrow 3x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{9} + \frac{k2\pi}{3}$$

2) $\sin 5x + \cos 5x = -\sqrt{2}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\sin 5x + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos 5x = -1 \Leftrightarrow \sin(5x + \frac{\pi}{4}) = -1 \Leftrightarrow 5x + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{3\pi}{20} + \frac{k2\pi}{5}$$

3) $\sqrt{3}\sin x + \cos x = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\Leftrightarrow \sin x \cos \frac{\pi}{6} + \cos x \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sin(x + \frac{\pi}{6}) = \sin \frac{\pi}{4}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{12} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

4) $\sqrt{3}\sin x - \cos x = \sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\Leftrightarrow \sin x \cos \frac{\pi}{6} - \cos x \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sin(x - \frac{\pi}{6}) = \sin \frac{\pi}{4}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5\pi}{12} + k2\pi \\ x = \frac{11\pi}{12} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

HT 3. Giải phương trình:

1) $3\sin 3x - \sqrt{3}\cos 9x = 1 + 4\sin^3 3x$

2) $\tan x - \sin 2x - \cos 2x + 2(2\cos x - \frac{1}{\cos x}) = 0$

3) $8 \sin x = \frac{\sqrt{3}}{\cos x} + \frac{1}{\sin x}$

4) $9 \sin x + 6 \cos x - 3 \sin 2x + \cos 2x = 8$

5) $\sin 2x + 2 \cos 2x = 1 + \sin x - 4 \cos x$

6) $2 \sin 2x - \cos 2x = 7 \sin x + 2 \cos x - 4$

7) $\sin 2x - \cos 2x = 3 \sin x + \cos x - 2$

8) $(\sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x)^2 - 5 = \cos(2x - \frac{\pi}{6})$

9) $2 \cos^3 x + \cos 2x + \sin x = 0$

10) $1 + \cot 2x = \frac{1 - \cos 2x}{\sin^2 2x}$

11) $4(\sin^4 x + \cos^4 x) + \sqrt{3} \sin 4x = 2$

12) $1 + \sin^3 2x + \cos^3 2x = \frac{1}{2} \sin 4x$

13) $\tan x - 3 \cot x = 4(\sin x + \sqrt{3} \cos x)$

14) $\sin^3 x + \cos^3 x = \sin x - \cos x$

15) $\cos^4 x + \sin^4(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{4}$

16) $4 \sin^3 x \cos 3x + 4 \cos^3 x \sin 3x + 3\sqrt{3} \cos 4x = 3$

<http://www.LuuHuyThuong.blogspot.com>

Bài giải

1) $3 \sin 3x - \sqrt{3} \cos 9x = 1 + 4 \sin^3 3x \Leftrightarrow (3 \sin 3x - 4 \sin^3 3x) - \sqrt{3} \cos 9x = 1$

$$\Leftrightarrow \sin 9x - \sqrt{3} \cos 9x = 1 \Leftrightarrow \sin(9x - \frac{\pi}{3}) = \sin \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{18} + k \frac{2\pi}{9} \\ x = \frac{7\pi}{54} + k \frac{2\pi}{9} \end{cases}$$

2) $\tan x - \sin 2x - \cos 2x + 2(2 \cos x - \frac{1}{\cos x}) = 0 \quad (1)$

Điều kiện: $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$(1) \Leftrightarrow \frac{\sin x}{\cos x} - \sin 2x - \cos 2x + 4 \cos x - \frac{2}{\cos x} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x - 2 \sin x \cos^2 x - \cos 2x \cos x + 2(2 \cos^2 x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x(1 - 2 \cos^2 x) - \cos 2x \cos x + 2 \cos 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow -\sin x \cos 2x - \cos 2x \cos x + 2 \cos 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos 2x(\sin x + \cos x - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = 0 \\ \sin x + \cos x = 2(vn) \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k \frac{\pi}{2}$$

3) $8 \sin x = \frac{\sqrt{3}}{\cos x} + \frac{1}{\sin x} \quad (*)$

Điều kiện: $\sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\frac{\pi}{2}$

$$(*) \Leftrightarrow 8\sin^2 x \cos x = \sqrt{3} \sin x + \cos x \Leftrightarrow 4(1 - \cos 2x) \cos x = \sqrt{3} \sin x + \cos x$$

$$\Leftrightarrow -4\cos 2x \cos x = \sqrt{3} \sin x - 3\cos x \Leftrightarrow -2(\cos 3x + \cos x) = \sqrt{3} \sin x - 3\cos x$$

$$\Leftrightarrow \cos 3x = \frac{1}{2}\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x \Leftrightarrow \cos 3x = \cos(x + \frac{\pi}{3}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

C2 (*) $\Leftrightarrow 8\sin^2 x \cos x = \sqrt{3} \sin x + \cos x \Leftrightarrow 8(1 - \cos^2 x) \cos x = \sqrt{3} \sin x + \cos x$

$$\Leftrightarrow 8\cos x - 8\cos^3 x = \sqrt{3} \sin x - 3\cos x \Leftrightarrow 6\cos x - 8\cos^3 x = \sqrt{3} \sin x - \cos x$$

$$\Leftrightarrow 4\cos^3 x - 3\cos x = \frac{1}{2}\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x \Leftrightarrow \cos 3x = \cos(x + \frac{\pi}{3})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

4) $9\sin x + 6\cos x - 3\sin 2x + \cos 2x = 8$

$$\Leftrightarrow 6\sin x \cos x - 6\cos x + 2\sin^2 x - 9\sin x + 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow 6\cos x(\sin x - 1) + (\sin x - 1)(2\sin x - 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x - 1)(6\cos x + 2\sin x - 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ 6\cos x + 2\sin x = 7 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

5) $\sin 2x + 2\cos 2x = 1 + \sin x - 4\cos x$

$$\Leftrightarrow 2\sin x \cos x + 2(2\cos^2 x - 1) - 1 - \sin x + 4\cos x = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x(2\cos x - 1) + 4\cos^2 x + 4\cos x - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x(2\cos x - 1) + (2\cos x - 1)(2\cos x + 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2\cos x - 1)(2\sin x + 2\cos x + 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{1}{2} \\ 2\sin x + 2\cos x = -3, (vn) \end{cases} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$$

6) $2\sin 2x - \cos 2x = 7\sin x + 2\cos x - 4$

$$\Leftrightarrow 4 \sin x \cos x - (1 - 2 \sin^2 x) - 7 \sin x - 2 \cos x + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos x(2 \sin x - 1) + (2 \sin^2 x - 7 \sin x + 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos x(2 \sin x - 1) + (2 \sin x - 1)(\sin x - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2 \sin x - 1)(2 \cos x + \sin x - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 \sin x - 1 = 0 \\ 2 \cos x + \sin x = 3, (vn) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$$

7) $\sin 2x - \cos 2x = 3 \sin x + \cos x - 2$

$$\Leftrightarrow 2 \sin x \cos x - (1 - 2 \sin^2 x) - 3 \sin x - \cos x + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2 \sin x \cos x - \cos x) + (2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x(2 \sin x - 1) + (2 \sin x - 1)(\sin x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2 \sin x - 1)(\cos x + \sin x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \sin x = 1 \\ \cos x + \sin x = 1 \end{cases}$$

$$+ 2 \sin x = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$$

$$+ \cos x + \sin x = 1 \Leftrightarrow \cos(x - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases}$$

8) $(\sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x)^2 - 5 = \cos(2x - \frac{\pi}{6})$

Ta có: $\sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x = 2(\frac{1}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x) = 2 \cos(2x - \frac{\pi}{6})$

Đặt: $t = \sin 2x + \sqrt{3} \cos 2x, -2 \leq t \leq 2$

Phương trình trở thành: $t^2 - 5 = \frac{t}{2} \Leftrightarrow 2t^2 - t - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ t = \frac{5}{2} \end{cases}$

$$+ t = \frac{5}{2} : \text{loại}$$

$$+ t = -2 : 2 \cos(2x - \frac{\pi}{6}) = -2 \Leftrightarrow x = \frac{7\pi}{12} + k\pi$$

9) $2\cos^3 x + \cos 2x + \sin x = 0 \Leftrightarrow 2\cos^3 x + 2\cos^2 x - 1 + \sin x = 0$

$$\Leftrightarrow 2\cos^2 x(\cos x + 1) - (1 - \sin x) = 0 \Leftrightarrow 2(1 - \sin^2 x)(\cos x + 1) - (1 - \sin x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2(1 - \sin x)(1 + \sin x)(\cos x + 1) - (1 - \sin x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (1 - \sin x)[2(1 + \sin x)(\cos x + 1) - 1] = 0$$

$$\Leftrightarrow (1 - \sin x)[1 + 2\sin x \cos x + 2(\sin x + \cos x)] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ 1 + 2\sin x \cos x + 2(\sin x + \cos x) = 0 \end{cases}$$

$$+ \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

$$+ 1 + 2\sin x \cos x + 2(\sin x + \cos x) = 0 \Leftrightarrow (\sin x + \cos x)^2 + 2(\sin x + \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)(\sin x + \cos x + 2) = 0 \Leftrightarrow \sin x + \cos x = 0$$

$$\Leftrightarrow \tan x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$$

10) $1 + \cot 2x = \frac{1 - \cos 2x}{\sin^2 2x}$ (*) Điều kiện: $\sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\frac{\pi}{2}$

$$(*) \Leftrightarrow 1 + \cot 2x = \frac{1 - \cos 2x}{1 - \cos^2 2x} \Leftrightarrow 1 + \cot 2x = \frac{1}{1 + \cos 2x} \Leftrightarrow 1 + \frac{\cos 2x}{\sin 2x} = \frac{1}{1 + \cos 2x}$$

$$\Leftrightarrow \sin 2x(1 + \cos 2x) + \cos 2x(1 + \cos 2x) = \sin 2x$$

$$\Leftrightarrow \sin 2x \cos 2x + \cos 2x(1 + \cos 2x) = 0 \Leftrightarrow \cos 2x(\sin 2x + \cos 2x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = 0 \\ \sin 2x + \cos 2x = -1 \end{cases}$$

$$+ \cos 2x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$$

$$+ \sin 2x + \cos 2x = -1 \Leftrightarrow \sin(2x + \frac{\pi}{4}) = \sin(-\frac{\pi}{4}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$$

Vậy, phương trình có nghiệm: $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$

11) $4(\sin^4 x + \cos^4 x) + \sqrt{3} \sin 4x = 2$

$$\Leftrightarrow 4[(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x] + \sqrt{3} \sin 4x = 2$$

$$\Leftrightarrow 4\left(1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x\right) + \sqrt{3}\sin 4x = 2 \Leftrightarrow \cos 4x + \sqrt{3}\sin 4x = -2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \\ x = -\frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

12) $1 + \sin^3 2x + \cos^3 2x = \frac{1}{2}\sin 4x$

$$\Leftrightarrow 2 - \sin 4x + 2(\sin 2x + \cos 2x)(1 - \sin 2x \cos 2x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2 - \sin 4x) + (\sin 2x + \cos 2x)(2 - \sin 4x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2 - \sin 4x)(\sin 2x + \cos 2x + 1) = 0 \Leftrightarrow \sin 2x + \cos 2x = -1$$

$$\Leftrightarrow \sin(2x + \frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$$

13) $\tan x - 3 \cot x = 4(\sin x + \sqrt{3} \cos x)$ (*)

Điều kiện: $\sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\frac{\pi}{2}$

$$(*) \Leftrightarrow \frac{\sin x}{\cos x} - 3 \frac{\cos x}{\sin x} = 4(\sin x + \sqrt{3} \cos x)$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 x - 3 \cos^2 x - 4 \sin x \cos x (\sin x + \sqrt{3} \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x - \sqrt{3} \cos x)(\sin x + \sqrt{3} \cos x) - 4 \sin x \cos x (\sin x + \sqrt{3} \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \sqrt{3} \cos x)(\sin x - \sqrt{3} \cos x - 4 \sin x \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x + \sqrt{3} \cos x = 0 \\ \sin x - \sqrt{3} \cos x - 4 \sin x \cos x = 0 \end{cases}$$

$$+ \sin x + \sqrt{3} \cos x = 0 \Leftrightarrow \tan x = -\sqrt{3} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$$

$$+ \sin x - \sqrt{3} \cos x - 4 \sin x \cos x = 0 \Leftrightarrow 2 \sin 2x = \sin x - \sqrt{3} \cos x$$

$$\Leftrightarrow \sin 2x = \frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \Leftrightarrow \sin 2x = \sin(x - \frac{\pi}{3}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{4\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases}$$

Vậy, phương trình có nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi; x = \frac{4\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3}$

14) $\sin^3 x + \cos^3 x = \sin x - \cos x \Leftrightarrow \sin x(\sin^2 x - 1) + \cos^3 x + \cos x = 0$

$$\Leftrightarrow -\sin x \cos^2 x + \cos^3 x + \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x(-\sin x \cos x + \cos^2 x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ -\sin x \cos x + \cos^2 x = -1 \end{cases}$$

$$+\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$+-\sin x \cos x + \cos^2 x = -1 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1 + \cos 2x}{2} = -1 \Leftrightarrow \sin 2x - \cos 2x = 3, (vn)$$

Vậy, phương trình có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$$15) \cos^4 x + \sin^4(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{1}{4}(1 + \cos 2x)^2 + \frac{1}{4}[1 - \cos(2x + \frac{\pi}{2})]^2 = \frac{1}{4}$$

$$\Leftrightarrow (1 + \cos 2x)^2 + (1 + \sin 2x)^2 = 1 \Leftrightarrow \sin 2x + \cos 2x = -1$$

$$\Leftrightarrow \cos(2x - \frac{\pi}{4}) = \cos \frac{3\pi}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}$$

$$16) 4\sin^3 x \cos 3x + 4\cos^3 x \sin 3x + 3\sqrt{3} \cos 4x = 3$$

$$\Leftrightarrow 4\sin^3 x(4\cos^3 x - 3\cos x) + 4\cos^3 x(3\sin x - 4\sin^3 x) + 3\sqrt{3} \cos 4x = 3$$

$$\Leftrightarrow -12\sin^3 x \cos x + 12\cos^3 x \sin x + 3\sqrt{3} \cos 4x = 3$$

$$\Leftrightarrow 4\sin x \cos x(\cos^2 x - \sin^2 x) + \sqrt{3} \cos 4x = 1$$

$$\Leftrightarrow 2\sin 2x \cos 2x + \sqrt{3} \cos 4x = 1 \Leftrightarrow \sin 4x + \sqrt{3} \cos 4x = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}\sin 4x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 4x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin(4x + \frac{\pi}{3}) = \sin \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{24} + k\frac{\pi}{2} \\ x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

HT 4. Giải phương trình:

$$1) \cos^4 x + \sin^4 x + \cos(x - \frac{\pi}{4}) \sin(3x - \frac{\pi}{4}) - \frac{3}{2} = 0$$

$$2) 5\sin x - 2 = 3(1 - \sin x)\tan^2 x$$

$$3) 2\sin 3x - \frac{1}{\sin x} = 2\cos 3x + \frac{1}{\cos x}$$

$$4) \frac{\cos x(2\sin x + 3\sqrt{2}) - 2\cos^2 x - 1}{1 + \sin 2x} = 1$$

$$5) \cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} - \sin x \sin \frac{x}{2} \sin \frac{3x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$6) 4\cos^3 x + 3\sqrt{2} \sin 2x = 8\cos x$$

$$7) \cos(2x + \frac{\pi}{4}) + \cos(2x - \frac{\pi}{4}) + 4 \sin x = 2 + \sqrt{2}(1 - \sin x) \quad 8) 3 \cot^2 x + 2\sqrt{2} \sin^2 x = (2 + 3\sqrt{2}) \cos x$$

$$9) \frac{4 \sin^2 2x + 6 \sin^2 x - 9 - 3 \cos 2x}{\cos x} = 0 \quad 10) \cos x + \cos 3x + 2 \cos 5x = 0$$

$$11) \sin^8 x + \cos^8 x = \frac{17}{16} \cos^2 2x$$

$$12) \sin \frac{5x}{2} = 5 \cos^3 x \sin \frac{x}{2}$$

$$13) \sin 2x(\cot x + \tan 2x) = 4 \cos^2 x$$

$$14) \tan^3(x - \frac{\pi}{4}) = \tan x - 1$$

$$15) \frac{\sin^4 2x + \cos^4 2x}{\tan(\frac{\pi}{4} - x) \tan(\frac{\pi}{4} + x)} = \cos^4 4x$$

$$16) 48 - \frac{1}{\cos^4 x} - \frac{2}{\sin^2 x} (1 + \cot 2x \cot x) = 0$$

$$17) \sin^8 x + \cos^8 x = 2(\sin^{10} x + \cos^{10} x) + \frac{5}{4} \cos 2x$$

<http://www.LuuHuyThuong.blogspot.com>

Bài giải

$$1) \cos^4 x + \sin^4 x + \cos(x - \frac{\pi}{4}) \sin(3x - \frac{\pi}{4}) - \frac{3}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x + \frac{1}{2} [\sin(4x - \frac{\pi}{2}) + \sin 2x] - \frac{3}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x + \frac{1}{2} (-\cos 4x + \sin 2x) - \frac{3}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \sin^2 2x - \frac{1}{2} (1 - 2 \sin^2 2x) + \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 2x + \sin 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$2) 5 \sin x - 2 = 3(1 - \sin x) \tan^2 x \quad (1)$$

Điều kiện: $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$(1) \Leftrightarrow 5 \sin x - 2 = 3(1 - \sin x) \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \Leftrightarrow 5 \sin x - 2 = 3(1 - \sin x) \frac{\sin^2 x}{1 - \sin^2 x}$$

$$\Leftrightarrow 5 \sin x - 2 = \frac{3 \sin^2 x}{1 + \sin x} \Leftrightarrow 2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$$

3) $2 \sin 3x - \frac{1}{\sin x} = 2 \cos 3x + \frac{1}{\cos x} \quad (*)$

Điều kiện: $\sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\frac{\pi}{2}$

$$(*) \Leftrightarrow 2(\sin 3x - \cos 3x) = \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x}$$

$$\Leftrightarrow 2[3(\sin x + \cos x) - 4(\sin^3 x + \cos^3 x)] = \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x}$$

$$\Leftrightarrow 2(\sin x + \cos x)[3 - 4(\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x)] = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x \cos x}$$

$$\Leftrightarrow 2(\sin x + \cos x)(-1 + 4 \sin x \cos x) - \frac{\sin x + \cos x}{\sin x \cos x} = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)(-2 + 8 \sin x \cos x - \frac{1}{\sin x \cos x}) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)(4 \sin 2x - \frac{2}{\sin 2x} - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)(4 \sin^2 2x - 2 \sin 2x - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x + \cos x = 0 \\ 4 \sin^2 2x - 2 \sin 2x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \tan x = -1 \\ \sin 2x = 1 \\ \sin 2x = -1/2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{12} + k\pi \\ x = \frac{7\pi}{12} + k\pi \end{cases}$$

4) $\frac{\cos x(2 \sin x + 3\sqrt{2}) - 2 \cos^2 x - 1}{1 + \sin 2x} = 1 \quad (*)$

Điều kiện: $\sin 2x \neq -1 \Leftrightarrow x \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi$

$$(*) \Leftrightarrow 2 \sin x \cos x + 3\sqrt{2} \cos x - 2 \cos^2 x - 1 = 1 + \sin 2x$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos^2 x - 3\sqrt{2} \cos x + 2 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{4} + k\pi$$

Đổi chiều điều kiện phương trình có nghiệm: $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$$5) \cos x \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} - \sin x \sin \frac{x}{2} \sin \frac{3x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \cos x (\cos 2x + \cos x) + \frac{1}{2} \sin x (\cos 2x - \cos x) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos x \cos 2x + \cos^2 x + \sin x \cos 2x - \sin x \cos x = 1$$

$$\Leftrightarrow \cos 2x(\sin x + \cos x) + 1 - \sin^2 x - \sin x \cos x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos 2x(\sin x + \cos x) - \sin x(\sin x + \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)(\cos 2x - \sin x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)(-2 \sin^2 x - \sin x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x + \cos x = 0 \\ 2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \tan x = -1 \\ \sin x = -1 \\ \sin x = 1/2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \vee x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$$

$$6) 4 \cos^3 x + 3\sqrt{2} \sin 2x = 8 \cos x \Leftrightarrow 4 \cos^3 x + 6\sqrt{2} \sin x \cos x - 8 \cos x = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos x (2 \cos^2 x + 3\sqrt{2} \sin x - 4) = 0 \Leftrightarrow 2 \cos x (2 \sin^2 x - 3\sqrt{2} \sin x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$$

$$7) \cos(2x + \frac{\pi}{4}) + \cos(2x - \frac{\pi}{4}) + 4 \sin x = 2 + \sqrt{2}(1 - \sin x)$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos 2x \cos \frac{\pi}{4} + 4 \sin x - 2 - \sqrt{2} + \sqrt{2} \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2}(1 - 2 \sin^2 x) + 4 \sin x - 2 - \sqrt{2} + \sqrt{2} \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\sqrt{2} \sin^2 x - (4 + \sqrt{2}) \sin x + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$$

8) $3 \cot^2 x + 2\sqrt{2} \sin^2 x = (2 + 3\sqrt{2}) \cos x$ (1)

Điều kiện: $\sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi$

$$(1) \Leftrightarrow 3 \frac{\cos^2 x}{\sin^4 x} + 2\sqrt{2} = (2 + 3\sqrt{2}) \frac{\cos x}{\sin^2 x}$$

Đặt: $t = \frac{\cos x}{\sin^2 x}$ phương trình trở thành: $3t^2 - (2 + 3\sqrt{2})t + 2\sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \sqrt{2} \\ t = \frac{2}{3} \end{cases}$

$$+t = \frac{2}{3} : \frac{\cos x}{\sin^2 x} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow 3 \cos x = 2(1 - \cos^2 x) \Leftrightarrow 2 \cos^2 x + 3 \cos x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$$

$$+t = \sqrt{2} : \frac{\cos x}{\sin^2 x} = \sqrt{2} \Leftrightarrow \cos x = \sqrt{2}(1 - \cos^2 x) \Leftrightarrow \sqrt{2} \cos^2 x + \cos x - \sqrt{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{4} + k2\pi$$

Vậy, phương trình có nghiệm: $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \pm \frac{\pi}{4} + k2\pi$

9) $\frac{4 \sin^2 2x + 6 \sin^2 x - 9 - 3 \cos 2x}{\cos x} = 0$

(*)

Điều kiện: $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$(*) \Leftrightarrow 4(1 - \cos^2 2x) + 3(1 - \cos 2x) - 9 - 3 \cos x = 0 \Leftrightarrow 4 \cos^2 2x + 6 \cos x + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = -1 \\ \cos 2x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi \end{cases}$$

Vậy, phương trình có nghiệm: $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi$

10) $\cos x + \cos 3x + 2 \cos 5x = 0 \Leftrightarrow (\cos 5x + \cos x) + (\cos 5x + \cos 3x) = 0$

$$\Leftrightarrow 2 \cos 3x \cos 2x + 2 \cos 4x \cos x = 0$$

$$\Leftrightarrow (4 \cos^3 x - 3 \cos x) \cos 2x + (2 \cos^2 2x - 1) \cos x = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x [(4 \cos^2 x - 3) \cos 2x + 2 \cos^2 2x - 1] = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x \{[2(1 + \cos 2x) - 3] \cos 2x + 2 \cos^2 2x - 1\} = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x(4\cos^2 2x - \cos 2x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos x = \frac{1-\sqrt{17}}{8} \\ \cos x = \frac{1+\sqrt{17}}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \pm \arccos \frac{1-\sqrt{17}}{8} + k2\pi \\ x = \pm \arccos \frac{1+\sqrt{17}}{8} + k2\pi \end{cases}$$

11) $\sin^8 x + \cos^8 x = \frac{17}{16} \cos^2 2x$ (*)

$$\sin^8 x + \cos^8 x = (\sin^4 x + \cos^4 x)^2 - 2\sin^4 x \cos^4 x$$

$$= [(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2\sin^2 x \cos^2 x]^2 - \frac{1}{8} \sin^4 2x$$

$$= (1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x)^2 - \frac{1}{8} \sin^4 2x = 1 - \sin^2 2x + \frac{1}{8} \sin^4 2x$$

$$(*) \Leftrightarrow 16(1 - \sin^2 2x + \frac{1}{8} \sin^4 2x) = 17(1 - \sin^2 2x) \Leftrightarrow 2\sin^4 2x + \sin^2 2x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1 - 2\sin^2 2x = 0 \Leftrightarrow \cos 4x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{4}$$

12) $\sin \frac{5x}{2} = 5 \cos^3 x \sin \frac{x}{2}$ (*)

Ta thấy: $\cos \frac{x}{2} = 0 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi \Leftrightarrow \cos x = -1$

Thay vào phương trình (*) ta được:

$$\sin(\frac{5\pi}{2} + 5k\pi) = -\sin(\frac{\pi}{2} + k\pi) \text{ không thỏa mãn với mọi } k$$

Do đó $\cos \frac{x}{2}$ không là nghiệm của phương trình nên:

$$(*) \Leftrightarrow \sin \frac{5x}{2} \cos \frac{x}{2} = 5 \cos^3 x \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2}(\sin 3x + \sin 2x) = \frac{5}{2} \cos^3 x \sin x$$

$$\Leftrightarrow 3\sin x - 4\sin^3 x + 2\sin x \cos x - 5\cos^3 x \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x(3 - 4\sin^2 x + 2\cos x - 5\cos^3 x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x(5\cos^3 x - 4\cos^2 x - 2\cos x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \\ \cos x = 1 \\ \cos x = \frac{-1 + \sqrt{21}}{10} \\ \cos x = \frac{-1 - \sqrt{21}}{10} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k\pi \\ x = k2\pi \\ x = \pm \arccos \frac{-1 + \sqrt{21}}{10} + k2\pi \\ x = \pm \arccos \frac{-1 - \sqrt{21}}{10} + k2\pi \end{cases}$$

Vậy, phương trình có nghiệm: $x = k2\pi, x = \pm \arccos \frac{-1 + \sqrt{21}}{10} + k2\pi$

$$x = \pm \arccos \frac{-1 - \sqrt{21}}{10} + k2\pi$$

13) $\sin 2x(\cot x + \tan 2x) = 4 \cos^2 x \quad (1)$

Điều kiện: $\begin{cases} \sin x \neq 0 \\ \cos 2x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq k\pi \\ x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \end{cases}$

Ta có: $\cot x + \tan 2x = \frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\sin 2x}{\cos 2x} = \frac{\cos 2x \cos x + \sin 2x \sin x}{\sin x \cos 2x} = \frac{\cos x}{\sin x \cos 2x}$

$$(1) \Leftrightarrow 2 \sin x \cos x \frac{\cos x}{\sin x \cos 2x} = 4 \cos^2 x$$

$$\Leftrightarrow \frac{\cos^2 x}{\cos 2x} = 2 \cos^2 x \Leftrightarrow \cos^2 x(1 - 2 \cos 2x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos 2x = 1/2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases}$$

Vậy, phương trình có nghiệm: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$

Vậy, phương trình có nghiệm: $x = k\frac{5\pi}{2}, x = \pm \frac{5}{4} \arccos \frac{1 - \sqrt{21}}{4} + k\frac{5\pi}{2}$

14) $\tan^3(x - \frac{\pi}{4}) = \tan x - 1 \quad (1)$

Điều kiện: $\begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \cos(x - \frac{\pi}{4}) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x \neq \frac{3\pi}{4} + k\pi \end{cases}$

$$(1) \Leftrightarrow \frac{(\tan x - 1)^3}{(1 + \tan x)^3} = \tan x - 1 \Leftrightarrow (\tan x - 1)^3 = (\tan x - 1)(1 + \tan x)^3$$

$$\Leftrightarrow (\tan x - 1)[(1 + \tan x)^3 - (\tan x - 1)^2] = 0 \quad \Leftrightarrow (\tan x - 1)(\tan^3 x + 2\tan^2 x + 5\tan x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \tan x(\tan x - 1)(\tan^2 x + 2\tan x + 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \tan x = 0 \\ \tan x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}$$

C2: Đặt: $t = x - \frac{\pi}{4}$

$$15) \frac{\sin^4 2x + \cos^4 2x}{\tan(\frac{\pi}{4} - x)\tan(\frac{\pi}{4} + x)} = \cos^4 4x \quad (1)$$

Điều kiện: $\begin{cases} \sin(\frac{\pi}{4} - x)\cos(\frac{\pi}{4} - x) \neq 0 \\ \sin(\frac{\pi}{4} + x)\cos(\frac{\pi}{4} + x) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin(\frac{\pi}{4} - 2x) \neq 0 \\ \sin(\frac{\pi}{4} + 2x) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \cos 2x \neq 0$

$$\tan(\frac{\pi}{4} - x)\tan(\frac{\pi}{4} + x) = \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \cdot \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = 1$$

$$(1) \Leftrightarrow \sin^4 2x + \cos^4 2x = \cos^4 4x \Leftrightarrow 1 - 2\sin^2 2x \cos^2 2x = \cos^4 4x$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2}\sin^2 4x = \cos^4 4x \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2}(1 - \cos^2 4x) = \cos^4 4x$$

$$\Leftrightarrow 2\cos^4 4x - \cos^2 4x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos^2 4x = 1$$

$$\Leftrightarrow 1 - \cos^2 4x = 0 \Leftrightarrow \sin 4x = 0 \Leftrightarrow x = k\frac{\pi}{4}$$

Vậy, phương trình có nghiệm: $x = k\frac{\pi}{2}$

$$16) 48 - \frac{1}{\cos^4 x} - \frac{2}{\sin^2 x}(1 + \cot 2x \cot x) = 0 \quad (*)$$

Điều kiện: $\sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\frac{\pi}{2}$

$$\text{Ta có: } 1 + \cot 2x \cot x = 1 + \frac{\cos 2x \cos x}{\sin 2x \sin x} = \frac{\cos 2x \sin x + \sin 2x \sin x}{\sin 2x \cos x}$$

$$= \frac{\cos x}{2\sin^2 x \cos x} = \frac{1}{2\sin^2 x}$$

$$(*) \Leftrightarrow 48 - \frac{1}{\cos^4 x} - \frac{1}{\sin^4 x} = 0 \Leftrightarrow 48 = \frac{1}{\cos^4 x} + \frac{1}{\sin^4 x}$$

$$\Leftrightarrow 48 \sin^4 x \cos^4 x = \sin^4 x + \cos^4 x \Leftrightarrow 3 \sin^4 2x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x$$

$$\Leftrightarrow 6 \sin^4 2x + \sin^2 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow \sin^2 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 1 - 2 \sin^2 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos 4x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{8} + k \frac{\pi}{4}$$

Vậy, phương trình có nghiệm: $x = \frac{\pi}{8} + k \frac{\pi}{4}$

$$17) \sin^8 x + \cos^8 x = 2(\sin^{10} x + \cos^{10} x) + \frac{5}{4} \cos 2x$$

$$\Leftrightarrow \sin^8 x(1 - 2 \sin^2 x) - \cos^8 x(2 \cos^2 x - 1) = \frac{5}{4} \cos 2x$$

$$\Leftrightarrow \sin^8 x \cos 2x - \cos^8 x \cos 2x = \frac{5}{4} \cos 2x$$

$$\Leftrightarrow 4 \cos 2x(\cos^8 x - \sin^8 x) + 5 \cos 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow 4 \cos 2x(\cos^4 x - \sin^4 x)(\cos^4 x + \sin^4 x) + 5 \cos 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow 4 \cos 2x(\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x)(\cos^4 x + \sin^4 x) + 5 \cos 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow 4 \cos 2x(\cos^2 x - \sin^2 x)\left(1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x\right) + 5 \cos 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow 4 \cos^2 2x\left(1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x\right) + 5 \cos 2x = 0 \Leftrightarrow 4 \cos 2x(4 \cos 2x - 2 \cos 2x \sin^2 2x + 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow 4 \cos 2x[4 \cos 2x - 2 \cos 2x(1 - \cos^2 2x) + 5] = 0$$

$$\Leftrightarrow 4 \cos 2x(2 \cos^3 2x + 2 \cos 2x + 5) = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k \frac{\pi}{2}$$

HT 5. Giải các phương trình sau:

$$1) \frac{\sin^4 x + \cos^4 x}{\sin 2x} = \frac{1}{2}(\tan x + \cot x)$$

$$2) 1 + \sin \frac{x}{2} \sin x - \cos \frac{x}{2} \sin^2 x = 2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right)$$

$$3) \sin(2x + \frac{17\pi}{2}) + 16 = 2\sqrt{3} \cdot \sin x \cos x + 20 \sin^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12} \right)$$

$$4) \sin x + \sin^2 x + \sin^3 x + \sin^4 x = \cos x + \cos^2 x + \cos^3 x + \cos^4 x$$

$$5) 2\sqrt{2} \cos \left(\frac{5\pi}{12} - x \right) \sin x = 1$$

$$6) \frac{\sin 2x}{\sin x + \cos x} + \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \tan x} = 2 \cos x$$

$$7) \cos^2 x + \sin x \sin 4x - \sin^2 4x = \frac{1}{4}$$

$$8) 2 \cos 4x - (\sqrt{3} - 2) \cos 2x = \sin 2x + \sqrt{3}$$

$$9) 1 + \sin x - \cos x - \sin 2x + \cos 2x = 0$$

$$10) \sin x \cos 2x + \cos^2 x (\tan^2 x - 1) + 2 \sin^3 x = 0$$

<http://www.LuuHuyThuong.blogspot.com>

Bài giải

$$1) \frac{\sin^4 x + \cos^4 x}{\sin 2x} = \frac{1}{2}(\tan x + \cot x) \quad (1)$$

Điều kiện: $\sin 2x \neq 0$

$$(1) \Leftrightarrow \frac{1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x}{\sin 2x} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} \right) \Leftrightarrow \frac{1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x}{\sin 2x} = \frac{1}{\sin 2x} \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x = 1 \Leftrightarrow \sin 2x = 0$$

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

$$2) 1 + \sin \frac{x}{2} \sin x - \cos \frac{x}{2} \sin^2 x = 2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \quad (1)$$

$$(1) \Leftrightarrow 1 + \sin \frac{x}{2} \sin x - \cos \frac{x}{2} \sin^2 x = 1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = 1 + \sin x$$

$$\Leftrightarrow \sin x \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \sin x - 1 \right) = 0 \Leftrightarrow \sin x \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} \cdot 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 1 \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x \left(\sin \frac{x}{2} - 1 \right) \left(2 \sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} + 1 \right) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0, \sin \frac{x}{2} = 1, 2 \sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = k\pi, \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow \begin{cases} x = k\pi \\ x = \pi + k4\pi \end{cases} \Leftrightarrow x = k\pi$$

$$3) \sin(2x + \frac{17\pi}{2}) + 16 = 2\sqrt{3} \cdot \sin x \cos x + 20 \sin^2(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12})$$

Biến đổi phương trình đó cho tương đương với

$$\cos 2x - \sqrt{3} \sin 2x + 10 \cos(x + \frac{\pi}{6}) + 6 = 0 \Leftrightarrow \cos(2x + \frac{\pi}{3}) + 5 \cos(x + \frac{\pi}{6}) + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos^2(x + \frac{\pi}{6}) + 5 \cos(x + \frac{\pi}{6}) + 2 = 0. Giải được \cos(x + \frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2} \text{ và } \cos(x + \frac{\pi}{6}) = -2 \text{ (loại)}$$

$$*Giải \cos(x + \frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2} \text{ được nghiệm } x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \text{ và } x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi$$

$$4) \sin x + \sin^2 x + \sin^3 x + \sin^4 x = \cos x + \cos^2 x + \cos^3 x + \cos^4 x$$

$$\sin x + \sin^2 x + \sin^3 x + \sin^4 x = \cos x + \cos^2 x + \cos^3 x + \cos^4 x$$

$$\sin x + \sin^2 x + \sin^3 x + \sin^4 x = \cos x + \cos^2 x + \cos^3 x + \cos^4 x$$

$$\Leftrightarrow (\sin x - \cos x) \cdot [2 + 2(\sin x + \cos x) + \sin x \cos x] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x - \cos x = 0 \\ 2 + 2(\sin x + \cos x) + \sin x \cos x = 0 \end{cases}$$

+ Với $\sin x - \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

+ Với $2 + 2(\sin x + \cos x) + \sin x \cos x = 0$, đặt $t = \sin x + \cos x \quad (t \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}])$

được pt: $t^2 + 4t = 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = -3 \text{(loại)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pi + m2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + m2\pi \end{cases} \quad (m \in \mathbb{Z})$

Vậy: $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, x = \pi + m2\pi, x = -\frac{\pi}{2} + m2\pi \quad (m \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z})$

5) $2\sqrt{2} \cos\left(\frac{5\pi}{12} - x\right) \sin x = 1$

$$2\sqrt{2} \cos\left(\frac{5\pi}{12} - x\right) \sin x = 1 \Leftrightarrow \sqrt{2} \left[\sin\left(2x - \frac{5\pi}{12}\right) + \sin\frac{5\pi}{12} \right] = 1$$

$$\Leftrightarrow \sin\left(2x - \frac{5\pi}{12}\right) + \sin\frac{5\pi}{12} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \sin\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \sin\left(2x - \frac{5\pi}{12}\right) = \sin\frac{\pi}{4} - \sin\frac{5\pi}{12} = \\ = 2 \cos\frac{\pi}{3} \sin\left(-\frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)$$

$$\Leftrightarrow \sin\left(2x - \frac{5\pi}{12}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{12}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - \frac{5\pi}{12} = -\frac{\pi}{12} + k2\pi \\ 2x - \frac{5\pi}{12} = \frac{13\pi}{12} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

6) $\frac{\sin 2x}{\sin x + \cos x} + \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \tan x} = 2 \cos x$

Điều kiện: $\sin x \neq 0, \cos x \neq 0, \sin x + \cos x \neq 0$.

Pt đã cho trở thành $\frac{\cos x}{\sqrt{2} \sin x} + \frac{2 \sin x \cos x}{\sin x + \cos x} - 2 \cos x = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{\cos x}{\sqrt{2} \sin x} - \frac{2 \cos^2 x}{\sin x + \cos x} = 0 \Leftrightarrow \cos x \left(\sin(x + \frac{\pi}{4}) - \sin 2x \right) = 0$$

+) $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

$$+) \sin 2x = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = x + \frac{\pi}{4} + m2\pi \\ 2x = \pi - x - \frac{\pi}{4} + n2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + m2\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + \frac{n2\pi}{3} \end{cases} \quad m, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{t2\pi}{3}, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Đổi chiều điều kiện ta có nghiệm của pt là: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi; \quad x = \frac{\pi}{4} + \frac{t2\pi}{3}, \quad k, t \in \mathbb{Z}$.

$$7) \cos^2 x + \sin x \sin 4x - \sin^2 4x = \frac{1}{4}$$

pt đã cho tương đương với pt:

$$\frac{1}{2}(1 + \cos 2x) + \frac{1}{2}(\cos 3x - \cos 5x) - \frac{1}{2}(1 - \cos 8x) = \frac{1}{4}$$

$$\Leftrightarrow \cos 3x \cos 5x + \frac{1}{2} \cos 3x - \frac{1}{2} \left(\cos 5x + \frac{1}{2} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\cos 5x + \frac{1}{2} \right) \left(\cos 3x - \frac{1}{2} \right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 5x + \frac{1}{2} = 0 \\ \cos 3x - \frac{1}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{2\pi}{15} + k\frac{2\pi}{5} \\ x = \pm \frac{\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases}$$

$$8) 2 \cos 4x - (\sqrt{3} - 2) \cos 2x = \sin 2x + \sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow 2(\cos 4x + \cos 2x) = (\cos 2x + 1) + \sin 2x$$

$$\Leftrightarrow 4 \cos 3x \cos x = 2\sqrt{3} \cos^2 x + 2 \sin x \cos x \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ 2 \cos 3x = \sqrt{3} \cos x + \sin x \end{cases}$$

$$+ \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$+ 2 \cos 3x = \sqrt{3} \cos x + \sin x \Leftrightarrow \cos 3x = \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = x - \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 3x = \frac{\pi}{6} - x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{12} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{24} + \frac{k\pi}{2} \end{cases}$$

$$9) 1 + \sin x - \cos x - \sin 2x + \cos 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow (1 - \sin 2x) + (\sin x - \cos x) + (\cos^2 x - \sin^2 x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x - \cos x) [(\sin x - \cos x) + 1 - (\sin x + \cos x)] = 0$$

$$\Leftrightarrow ((\sin x - \cos x)(1 - 2 \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \tan x = 1 \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + l\pi \end{cases} \quad (k, l \in \mathbb{Z}) \quad (k, l \in \mathbb{Z}).$$

10) $\sin x \cos 2x + \cos^2 x (\tan^2 x - 1) + 2 \sin^3 x = 0$

Điều kiện $\cos x \neq 0$

$$\sin x \cos 2x + \cos^2 x (\tan^2 x - 1) + 2 \sin^3 x = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x (1 - 2 \sin^2 x) + 2 \sin^2 x - 1 + 2 \sin^3 x = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = -1 \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$$

Kết hợp điều kiện, phương trình có nghiệm $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi \right\}$

HT 6. Giải các phương trình sau:

1) $\sqrt{2} \cdot \cos 2x = \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x}$ (1)

2) $2 \cos 3x \cdot \cos x + \sqrt{3}(1 + \sin 2x) = 2\sqrt{3} \cos^2(2x + \frac{\pi}{4})$

3) $\cos x + \cos 3x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

4) $\frac{1}{\tan x + \cot 2x} = \frac{\sqrt{2}(\sin x - \cos x)}{\cot x - 1}$

5) $\frac{4\sqrt{3} \sin x \cos^2 x - 2 \cos \frac{5x}{2} \cos \frac{x}{2} + \sqrt{3} \sin 2x + 3 \cos x + 2}{2 \sin x - \sqrt{3}} = 0$ (1)

6) $2 \sin 2x + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 5 \sin x - 3 \cos x = 3$

7) $(\tan x + 1) \sin^2 x + \cos 2x + 2 = 3(\cos x + \sin x) \sin x.$ **8)** $\sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 3 \sin x + \cos x + 2$

9) $\frac{(1 + \sin x)(5 - 2 \sin x)}{(2 \sin x + 3) \cos x} = \sqrt{3}$

10) $\tan 2x - \tan x = \frac{1}{6}(\sin 4x + \sin 2x)(1)$

<http://www.LuuHuyThuong.blogspot.com>

Bài giải

1) $\sqrt{2} \cdot \cos 2x = \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x}$ (1) Điều kiện: $x \neq k\frac{\pi}{2}$

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{2} \cdot \cos 2x - \frac{\cos x + \sin x}{\sin x \cdot \cos x} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)\sin 2x - (\cos x + \sin x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\cos x + \sin x)[(\cos x - \sin x)\sin 2x - \sqrt{2}] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x + \sin x = 0 \\ (\cos x - \sin x)\sin 2x - \sqrt{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0 \\ (\cos x - \sin x)\left(1 - (\cos x - \sin x)^2\right) - \sqrt{2} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0 \\ (\cos x - \sin x)^3 - (\cos x - \sin x) + \sqrt{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-\pi}{4} + k\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$$

$$\text{ĐS: } x = \frac{-\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) $2 \cos 3x \cdot \cos x + \sqrt{3}(1 + \sin 2x) = 2\sqrt{3} \cos^2(2x + \frac{\pi}{4})$

$$PT \Leftrightarrow \cos 4x + \cos 2x + \sqrt{3}(1 + \sin 2x) = \sqrt{3} \left[1 + \cos(4x + \frac{\pi}{2}) \right] \Leftrightarrow \cos 4x + \sqrt{3} \sin 4x + \cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin(4x + \frac{\pi}{6}) + \sin(2x + \frac{\pi}{6}) = 0 \Leftrightarrow 2 \sin(3x + \frac{\pi}{6}) \cdot \cos x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{18} + k\frac{\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$$

Vậy PT có hai nghiệm $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ và $x = -\frac{\pi}{18} + k\frac{\pi}{3}$.

3) $\cos x + \cos 3x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$

$$\Leftrightarrow 2 \cos 2x \cos x = 1 + \sin 2x + \cos 2x \Leftrightarrow \cos 2x(2 \cos x - 1) = 1 + 2 \sin x \cos x$$

$$\Leftrightarrow (\cos^2 x - \sin^2 x)(2 \cos x - 1) = (\cos x + \sin x)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x + \sin x = 0 \\ (\cos x - \sin x)(2 \cos x - 1) = \cos x + \sin x \end{cases} \quad (1) \quad (2)$$

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{4} = k\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$(2) \Leftrightarrow 2 \cos x(\cos x - \sin x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x + \frac{\pi}{4} = \pm \frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$$

Vậy pt có nghiệm là $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, x = \frac{\pi}{2} + k\pi, x = k2\pi$

$$4) \frac{1}{\tan x + \cot 2x} = \frac{\sqrt{2}(\sin x - \cos x)}{\cot x - 1}$$

Điều kiện : $\begin{cases} \sin x \neq 0 \\ \cot x \neq 1 \end{cases}$

Phương trình đã cho tương đương với phương trình:

$$\frac{1}{\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos 2x}{\sin 2x}} = \frac{\sqrt{2}(\sin x - \cos x)}{\frac{\cos x - \sin x}{\sin x}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\cos x \cdot \sin 2x}{\cos x} = \frac{\sqrt{2}(\sin x - \cos x) \sin x}{\cos x - \sin x}$$

$$\Leftrightarrow \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Đổi chiều điều kiện ta được nghiệm của phương trình là: $x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$

$$5) \frac{4\sqrt{3}\sin x \cos^2 x - 2\cos \frac{5x}{2} \cos \frac{x}{2} + \sqrt{3}\sin 2x + 3\cos x + 2}{2\sin x - \sqrt{3}} = 0 \quad (1)$$

Điều kiện : $\sin x \neq \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$2\sqrt{3}\sin 2x \cos x - \cos 3x - \cos 2x + \sqrt{3}\sin 2x + 3\cos x + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3}\sin 2x(2\cos x + 1) - (\cos 3x - \cos x) - (\cos 2x - 1) + 2\cos x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3}\sin 2x(2\cos x + 1) + 4\cos x \sin^2 x + 2\sin^2 x + 2\cos x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3}\sin 2x(2\cos x + 1) + 2\sin^2 x(2\cos x + 1) + (2\cos x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2\cos x + 1)(\sqrt{3}\sin 2x + 2\sin^2 x + 1) = 0 \Leftrightarrow (2\cos x + 1)(\sqrt{3}\sin 2x - \cos 2x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2\cos x + 1 = 0 \\ \sqrt{3}\sin 2x - \cos 2x + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = -\frac{1}{2} \\ \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \\ x = k\pi; x = \frac{-\pi}{3} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

Đổi chiều điều kiện ta được nghiệm của phương trình là: $x = k\pi; x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi; x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

$$6) 2\sin 2x + \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 5\sin x - 3\cos x = 3 \quad (1)$$

$$(1) \Leftrightarrow 2\sin 2x + \sin 2x + \cos 2x + 5\sin x - 3\cos x = 3$$

$$\Leftrightarrow 6\sin x \cos x - 3\cos x - (2\sin^2 x - 5\sin x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 3\cos x(2\sin x - 1) - (2\sin x - 1)(\sin x - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2\sin x - 1)(3\cos x - \sin x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2}, \sin x - 3\cos x = 2$$

$$+ \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{aligned} \sin x - 3\cos x = 2 &\Leftrightarrow \sin(x - \alpha) = \frac{2}{\sqrt{10}}, (\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}) \Leftrightarrow x = \alpha + \arcsin \frac{2}{\sqrt{10}} + k2\pi \\ x = \pi + \alpha - \arcsin \frac{2}{\sqrt{10}} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} & \end{aligned}$$

Vậy pt có 4 họ nghiệm :

$$x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi, x = \alpha + \arcsin \frac{2}{\sqrt{10}} + k2\pi, \pi + \alpha - \arcsin \frac{2}{\sqrt{10}} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}$$

$$7) (\tan x + 1)\sin^2 x + \cos 2x + 2 = 3(\cos x + \sin x)\sin x.$$

Điều kiện: $\cos x \neq 0$, hay $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Khi đó phương trình đã cho tương đương với

$$(\tan x + 1)\sin^2 x + 1 - 2\sin^2 x + 2 = 3(\cos x + \sin x)\sin x \Leftrightarrow (\tan x - 1)\sin^2 x + 3 = 3(\cos x - \sin x)\sin x + 6\sin^2 x$$

$$\Leftrightarrow (\tan x - 1)\sin^2 x + 3\cos 2x = 3(\cos x - \sin x)\sin x$$

$$\Leftrightarrow (\tan x - 1)\sin^2 x + 3(\cos x - \sin x)\cos x = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x - \cos x)(\sin^2 x - 3\cos^2 x) = 0 \Leftrightarrow (\sin x - \cos x)(2\cos 2x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \cos x \\ \cos 2x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$$8) \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) = 3\sin x + \cos x + 2$$

$$\Leftrightarrow \sin 2x + \cos 2x = 3\sin x + \cos x + 2$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x - 1 = 3 \sin x + \cos x + 2$$

$$\Leftrightarrow \sin x(2 \cos x - 3) + 2 \cos^2 x - \cos x - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x(2 \cos x - 3) + (\cos x + 1)(2 \cos x - 3) = 0 \Leftrightarrow (2 \cos x - 3)(\sin x + \cos x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x + \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x + \cos x = -1 \Leftrightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} + k2\pi \end{cases}, \quad (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \pi + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

9) $\frac{(1 + \sin x)(5 - 2 \sin x)}{(2 \sin x + 3) \cos x} = \sqrt{3}$

$$\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{(1 + \sin x)(5 - 2 \sin x)}{(2 \sin x + 3) \cos x} = \sqrt{3} \Leftrightarrow 5 + 3 \sin x - 2 \sin^2 x = \sqrt{3} \sin 2x + 3\sqrt{3} \cos x \Leftrightarrow$$

$$(5 + 3 \sin x - 2 \sin^2 x) - (\sqrt{3} \sin 2x + 3\sqrt{3} \cos x) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) - 3 \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 3 \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 1 \\ \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases}$$

Đổi chiều điều kiện ta có các nghiệm $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

10) $\tan 2x - \tan x = \frac{1}{6}(\sin 4x + \sin 2x)(1)$

Điều kiện: $\begin{cases} \cos 2x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{m\pi}{2}, m \in \mathbb{Z} \\ x \neq \frac{\pi}{2} + m\pi \end{cases}$

$$(1) \Leftrightarrow 6 \sin x = \cos 2x \cos x (\sin 4x + \sin 2x)$$

$$\Leftrightarrow 6 \sin x = \cos x \cos 2x (4 \sin x \cos x \cos 2x + 2 \sin x \cos x)$$

$$\Leftrightarrow \sin x (4 \cos^2 x \cos^2 2x + 2 \cos^2 x \cos 2x - 6) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x [(2 \cos^2 2x (1 + \cos 2x) + \cos 2x (1 + \cos 2x) - 6)] = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x (2 \cos^3 2x + 3 \cos^2 2x + \cos 2x - 6) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x (\cos 2x - 1) (2 \cos^2 2x + 5 \cos 2x + 6) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \\ \cos 2x = 1 \\ 2\cos^2 2x + 5\cos 2x + 6 = 0(VN) \end{cases} \Leftrightarrow x = k\pi (tm) k \in Z$$

LƯU HUY THƯỜNG

HT 7. Giải các phương trình sau:

1) $2(\sin x - \cos x) + \sin 3x + \cos 3x = 3\sqrt{2}(2 + \sin 2x)$

2) $4\sin^2 \frac{x}{2} - \sqrt{3}\cos 2x = 1 + 2\cos^2(x - \frac{3\pi}{4})$

3) $3\cot^2 x + 2\sqrt{2}\sin^2 x = (2 + 3\sqrt{2})\cos x$

5) $2 + \sqrt{3}(\sin 2x - 3\sin x) = \cos 2x + 3\cos x$

7) $\tan^2 x + (1 + \tan^2 x)(2 - 3\sin x) - 1 = 0$

9) $\cos 2x + 5 = 2\sqrt{2}(2 - \cos x)\sin(x - \frac{\pi}{4})$

4) $\frac{1}{\tan x + \cot 2x} = \frac{\sqrt{2}(\cos x - \sin x)}{\cot x - 1}$

6) $\frac{1 + \sin 2x - \cos 2x}{1 + \tan^2 x} = \cos x(\sin 2x + 2\cos^2 x)$

8) $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{3}\cos 2x - 1$

10) $\frac{\cos^3 x - \cos^2 x}{\sin x + \cos x} = 2(1 + \sin x).$

<http://www.LuuHuyThuong.blogspot.com>

Bài giải

1) $2(\sin x - \cos x) + \sin 3x + \cos 3x = 3\sqrt{2}(2 + \sin 2x)$

$$\Leftrightarrow 2(\sin x - \cos x) + 3\sin x - 4\sin^3 x + 4\cos^3 x - 3\cos x = 3\sqrt{2}(2 + \sin 2x)$$

$$\Leftrightarrow 5(\sin x - \cos x) - 4(\sin x - \cos x)(1 + \sin x \cos x) = 3\sqrt{2}(2 + \sin 2x)$$

$$\Leftrightarrow (\sin x - \cos x)(1 - 4\sin x \cos x) = 3\sqrt{2}(2 + \sin 2x) \quad (1)$$

+ Đặt $t = \sin x - \cos x \quad -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ thì $t^2 = 1 - \sin 2x$

$$+ (1) \text{ trở thành } t[1 + 2(t^2 - 1)] = 3\sqrt{2}(3 - t^2)$$

$$\Leftrightarrow 2t^3 + 3\sqrt{2}t^2 - t - 9\sqrt{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow (t - \sqrt{2})(2t^2 + 5\sqrt{2}t + 9) = 0 \Leftrightarrow t = \sqrt{2}$$

$$+ \sin x - \cos x = \sqrt{2} \Leftrightarrow \sin(x - \frac{\pi}{4}) = 1 \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi$$

2) $4\sin^2 \frac{x}{2} - \sqrt{3}\cos 2x = 1 + 2\cos^2(x - \frac{3\pi}{4})$

Ta có: $4\sin^2 \frac{x}{2} - \sqrt{3}\cos 2x = 1 + 2\cos^2(x - \frac{3\pi}{4}) \Leftrightarrow 2(1 - \cos x) - \sqrt{3}\cos 2x = 1 + 1 + \cos(2x - \frac{3\pi}{2})$

$$\Leftrightarrow 2(1 - \cos x) - \sqrt{3}\cos 2x = 2 - \sin 2x \Leftrightarrow \sqrt{3}\cos 2x - \sin 2x = -2\cos x$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \sin 2x = -\cos x \Leftrightarrow \cos(2x + \frac{\pi}{6}) = \cos(\pi - x)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + \frac{\pi}{6} = \pi - x + k2\pi \\ 2x + \frac{\pi}{6} = x - \pi + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5\pi}{18} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = -\frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

3) $3 \cot^2 x + 2\sqrt{2} \sin^2 x = (2 + 3\sqrt{2}) \cos x$

Điều kiện: $x \neq k\pi$

$$3 \cos x \left(\frac{\cos x}{\sin^2 x} - \sqrt{2} \right) = 2(\cos x - \sqrt{2} \sin^2 x)$$

$$\Leftrightarrow (\cos x - \sqrt{2} \sin^2 x)(3 \cos x - 2 \sin^2 x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2} \cos^2 x + \cos x - \sqrt{2} = 0 \\ 2 \cos^2 x + 3 \cos x - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \cos x = -\sqrt{2} \text{ (loai)}; \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}; \cos x = -2 \text{ (loai)}; \cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \frac{\pi}{4} + k2\pi \quad \& \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$$

4) $\frac{1}{\tan x + \cot 2x} = \frac{\sqrt{2}(\cos x - \sin x)}{\cot x - 1}$

Điều kiện: $\begin{cases} \cos x \cdot \sin 2x \cdot \sin x \cdot (\tan x + \cot 2x) \neq 0 \\ \cot x \neq 1 \end{cases}$

Từ (1) ta có: $\frac{1}{\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos 2x}{\sin 2x}} = \frac{\sqrt{2}(\cos x - \sin x)}{\frac{\cos x}{\sin x} - 1} \Leftrightarrow \frac{\cos x \cdot \sin 2x}{\cos x} = \sqrt{2} \sin x \Leftrightarrow 2 \sin x \cdot \cos x = \sqrt{2} \sin x$

$$\Leftrightarrow \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Giao với điều kiện, ta được họ nghiệm của phương trình đã cho là $x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

5) $2 + \sqrt{3}(\sin 2x - 3 \sin x) = \cos 2x + 3 \cos x$

Phương trình đã cho tương đương với:

$$1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x - 3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x \right) = 0 \Leftrightarrow 1 - \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) - 3 \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 3\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 0; \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{3}{2} \text{ (loại)}$$

Với $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

7) $\frac{1 + \sin 2x - \cos 2x}{1 + \tan^2 x} = \cos x(\sin 2x + 2\cos^2 x)$

Điều kiện: $\cos x \neq 0$.

Biến đổi PT vè:

$$\cos^2 x(1 + \sin 2x - \cos 2x) = \cos^2 x(2\sin x + 2\cos x)$$

$$\Leftrightarrow 1 + \sin 2x - \cos 2x = 2(\sin x + \cos x) \text{ (vì } \cos x \neq 0)$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)^2 - (\cos^2 x - \sin^2 x) - 2(\sin x + \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)[\sin x + \cos x - (\cos x - \sin x) - 2] = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)(2\sin x - 2) = 0 \Leftrightarrow \sin x + \cos x = 0 \text{ hoặc } 2\sin x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \tan x = -1 \text{ hoặc } \sin x = 1 \text{ (không thỏa } \cos x = 0) \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$$

8) $\tan^2 x + (1 + \tan^2 x)(2 - 3\sin x) - 1 = 0$

Điều kiện $\cos x \neq 0$

Phương trình viết lại $2 - 3\sin x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$

$$\Leftrightarrow 2 - 3\sin x = \cos 2x \Leftrightarrow 2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x = 1; \sin x = \frac{1}{2}$$

So sánh đ/k chọn $\sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

9) $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{3}\cos 2x - 1 \Leftrightarrow 2\cos x \cdot \cos\frac{\pi}{4} = \frac{1}{3}(2\cos^2 x - 1) - 1$

$$\Leftrightarrow 3\sqrt{2}\cos x = 2\cos^2 x - 4 \Leftrightarrow 2\cos^2 x - 3\sqrt{2}\cos x - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow (\cos x - 2\sqrt{2})(\cos x + \frac{\sqrt{2}}{2}) = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow x = \pm\frac{3\pi}{4} + 2k\pi.$$

10) $\cos 2x + 5 = 2\sqrt{2}(2 - \cos x)\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

$$\text{Phương trình} \Leftrightarrow (\cos x - \sin x)^2 - 4(\cos x - \sin x) - 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x - \sin x = -1 \\ \cos x - \sin x = 5 \quad (\text{loại vì } \cos x - \sin x \leq \sqrt{2}) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ x = \pi + k2\pi \end{cases}$$

$$10) \frac{\cos^3 x - \cos^2 x}{\sin x + \cos x} = 2(1 + \sin x).$$

ĐK: $\sin x + \cos x \neq 0$

$$\text{Khi đó } PT \Leftrightarrow (1 - \sin^2 x)(\cos x - 1) = 2(1 + \sin x)(\sin x + \cos x)$$

$$\Leftrightarrow (1 + \sin x)(1 + \cos x + \sin x + \sin x \cdot \cos x) = 0 \Leftrightarrow (1 + \sin x)(1 + \cos x)(1 + \sin x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = -1 \\ \cos x = -1 \end{cases} \quad (\text{thoả mãn điều kiện}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \pi + m2\pi \end{cases} \quad (k, m \in \mathbb{Z})$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$ và $x = \pi + m2\pi \quad (k, m \in \mathbb{Z})$

HT 8. Giải các phương trình sau:

$$1) \frac{4 \sin^4 x + 4 \cos^4(x - \frac{\pi}{4}) - 1}{\cos 2x} = 2$$

$$2) \frac{4 \sin x \cdot \sin(x + \frac{\pi}{3}) + 5\sqrt{3} \sin x + 3(\cos x + 2)}{1 - 2 \cos x} = 1$$

$$3) \frac{\cos^2 x \cdot (\cos x - 1)}{\sin x + \cos x} = 2(1 + \sin x)$$

$$4) \frac{(\sin x + \cos x)^2 - 2 \sin^2 x}{1 + \cot^2 x} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right) \right]$$

$$5) \frac{\sin 2x}{\sin x + \cos x} + \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \tan x} = 2 \cos x \quad (1)$$

$$6) \frac{1}{\cos^2 x} - (\cos x + \sin x \cdot \tan x) = \frac{\sin(x - \frac{\pi}{6}) + \cos(\frac{\pi}{3} - x)}{\cos x}$$

$$7) 2 \cos^2 x + 2\sqrt{3} \sin x \cos x + 1 = 3(\sin x + \sqrt{3} \cos x)$$

$$8) \frac{(1 - \sin x + \sqrt{2} \cos 2x) \sin(x + \frac{\pi}{4})}{1 + \cot x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x (\cos x + 1)$$

$$9) \frac{(\sin x + \cos x)^2 - 2 \sin^2 x}{1 + \cot^2 x} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right) \right]$$

$$10) \sin x \cos 2x + \cos^2 x (\tan^2 x - 1) + 2 \sin^3 x = 0$$

Bài giải

$$1) \frac{4\sin^4 x + 4\cos^4(x - \frac{\pi}{4}) - 1}{\cos 2x} = 2 \quad (1)$$

ĐK: $\cos 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$

$$(1) \Leftrightarrow (1 - \cos 2x)^2 + \left(1 + \cos(2x - \frac{\pi}{2})\right)^2 - 1 = 2 \cos 2x$$

$$\Leftrightarrow (1 - \cos 2x)^2 + (1 + \sin 2x)^2 - 1 = 2 \cos 2x$$

$$\Leftrightarrow 2 - 2 \cos 2x + 2 \sin 2x = 2 \cos 2x \Leftrightarrow 2 \cos 2x - \sin 2x = 1$$

$$\Leftrightarrow 2(\cos^2 x - \sin^2 x) - (\cos x + \sin x)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (\cos x + \sin x)(\cos x - 3 \sin x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x + \sin x = 0 \\ \cos x - 3 \sin x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \\ x = \arctan 3 + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Kết hợp với điều kiện phương trình đã cho có nghiệm là $x = \arctan 3 + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$

$$2) \frac{4 \sin x \cdot \sin(x + \frac{\pi}{3}) + 5\sqrt{3} \sin x + 3(\cos x + 2)}{1 - 2 \cos x} = 1$$

Điều kiện: $x \neq \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$

$$PT \Leftrightarrow 1 - 2 \cdot \cos(2x + \frac{\pi}{3}) + 5(\sqrt{3} \sin x + \cos x) + 5 = 0 \Leftrightarrow 4 \cdot \sin^2(x + \frac{\pi}{6}) + 10 \sin(x + \frac{\pi}{6}) + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin(x + \frac{\pi}{6}) = -1/2 \\ \sin(x + \frac{\pi}{6}) = -2 \end{cases} \quad (VN) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \pi + k2\pi \end{cases} \quad (L)$$

Vậy, $S = \{\pi + k2\pi\}$

$$3) \frac{\cos^2 x \cdot (\cos x - 1)}{\sin x + \cos x} = 2(1 + \sin x)$$

ĐK: $x \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi$.

$$PT \Leftrightarrow (1 + \sin x)(1 - \sin x)(\cos x - 1) = 2(1 + \sin x)(\sin x + \cos x)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 + \sin x = 0 \\ \sin x + \cos x + \sin x \cos x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + \sin x = 0 \\ (1 + \sin x)(\cos x + 1) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = \pi + k2\pi \end{cases} \quad (\text{Thoả mãn điều kiện})$$

$$4) \frac{(\sin x + \cos x)^2 - 2 \sin^2 x}{1 + \cot^2 x} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left[\sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4} - 3x\right) \right].$$

Điều kiện xác định $\sin x \neq 0$ hay $x \neq k\pi; k \in \mathbb{Z}$.

Phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{aligned} (\cos 2x + \sin 2x) \sin^2 x &= \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - 2x\right) \sin x \Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi}{4} - 2x\right)(\sin x - 1) = 0 \\ \Leftrightarrow \left[\cos\left(\frac{\pi}{4} - 2x\right) = 0 \right] &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \\ \sin x - 1 = 0 \end{cases} \quad (k, m \in \mathbb{Z}) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + m2\pi \\ x = \frac{\pi}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

So với điều kiện nghiệm của phương trình là $x = \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}; x = \frac{\pi}{2} + m2\pi; (k, m \in \mathbb{Z})$

$$5) \frac{\sin 2x}{\sin x + \cos x} + \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \tan x} = 2 \cos x \quad (1)$$

Điều kiện: $\sin x \neq 0, \cos x \neq 0, \sin x + \cos x \neq 0$.

$$(1) \Leftrightarrow \frac{\cos x}{\sqrt{2} \sin x} + \frac{2 \sin x \cos x}{\sin x + \cos x} - 2 \cos x = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\cos x}{\sqrt{2} \sin x} - \frac{2 \cos^2 x}{\sin x + \cos x} = 0 \Leftrightarrow \cos x \left(\sin(x + \frac{\pi}{4}) - \sin 2x \right) = 0$$

$$+) \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$+) \sin 2x = \sin(x + \frac{\pi}{4}) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = x + \frac{\pi}{4} + m2\pi \\ 2x = \pi - x - \frac{\pi}{4} + n2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + m2\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + \frac{n2\pi}{3} \end{cases} \quad m, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{t2\pi}{3}, \quad t \in \mathbb{Z}$$

So sánh điều kiện, nghiệm của phương trình: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi; x = \frac{\pi}{4} + \frac{t2\pi}{3}, \quad k, t \in \mathbb{Z}$.

$$6) \frac{1}{\cos^2 x} - (\cos x + \sin x \cdot \tan \frac{x}{2}) = \frac{\sin(x - \frac{\pi}{6}) + \cos(\frac{\pi}{3} - x)}{\cos x}$$

Điều kiện $\begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \cos \frac{x}{2} \neq 0 \end{cases}$.

$$\begin{aligned} \text{Phương trình} &\Leftrightarrow \frac{1}{\cos^2 x} - (\cos x + 2 \sin^2 \frac{x}{2}) = \frac{\cos(\frac{2\pi}{3} - x) + \cos(\frac{\pi}{3} - x)}{\cos x} \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{\cos^2 x} - (\cos x + 1 - \cos x) = \frac{2 \cos(\frac{\pi}{2} - x) \cos \frac{\pi}{6}}{\cos x} \Leftrightarrow \frac{1}{\cos^2 x} - 1 = \frac{\sqrt{3} \sin x}{\cos x} \Leftrightarrow \tan^2 x = \sqrt{3} \tan x \end{aligned}$$

$$\tan^2 x - \sqrt{3} \tan x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \tan x = 0 \\ \tan x = \sqrt{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k\pi \\ x = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

Đối chiếu điều kiện ta thấy nghiệm của phương trình là $\begin{cases} x = 2l\pi \\ x = \frac{\pi}{3} + l\pi \quad (l \in \mathbb{Z}) \end{cases}$

7) Giải phương trình $2\cos^2 x + 2\sqrt{3} \sin x \cos x + 1 = 3(\sin x + \sqrt{3} \cos x)$.

$$2\cos^2 x + 2\sqrt{3} \sin x \cos x + 1 = 3(\sin x + \sqrt{3} \cos x) \Leftrightarrow (\sin x + \sqrt{3} \cos x)^2 - 3(\sin x + \sqrt{3} \cos x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x + \sqrt{3} \cos x = 0 \vee \sin x + \sqrt{3} \cos x = 3 \quad (1)$$

Phương trình $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 3$ vô nghiệm vì $1^2 + (\sqrt{3})^2 < 3^2$

Nên (1) $\Leftrightarrow \tan x = -\sqrt{3} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$. Vậy, PT có nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

$$8) \frac{(1 - \sin x + \sqrt{2} \cos 2x) \sin(x + \frac{\pi}{4})}{1 + \cot x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x (\cos x + 1)$$

Đk: $\begin{cases} \sin x \neq 0 \\ \cot x \neq -1 \end{cases}$

$$\text{pt} \Leftrightarrow \frac{(1 - \sin x + \sqrt{2} \cos 2x)(\sin x + \cos x)}{\sqrt{2} \cdot \frac{\sin x + \cos x}{\sin x}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sin x (\cos x + 1)$$

$$\Leftrightarrow 1 - \sin x + \sqrt{2} \cos 2x = \cos x + 1 \Leftrightarrow \sin x + \cos x = \sqrt{2} \cos 2x$$

$$\Leftrightarrow \sin x + \cos x = \sqrt{2} (\cos x + \sin x)(\cos x - \sin x) \Leftrightarrow \sqrt{2} (\cos x - \sin x) = 1$$

$$\Leftrightarrow 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 1 \Leftrightarrow \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Kết hợp } dk \Rightarrow \text{nghiệm phương trình: } x = \frac{\pi}{12} + k2\pi \text{ hoặc } x = -\frac{7\pi}{12} + k2\pi$$

.

$$9) \frac{(\sin x + \cos x)^2 - 2 \sin^2 x}{1 + \cot^2 x} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\sin \left(\frac{\pi}{4} - x \right) - \sin \left(\frac{\pi}{4} - 3x \right) \right)$$

Điều kiện: $\sin x \neq 0$ (*). Khi đó:

Phương trình đã cho tương đương với: $(\sin 2x + \cos 2x) \cdot \sin^2 x = \sqrt{2} \cos \left(\frac{\pi}{4} - 2x \right) \cdot \sin x$

$$\Leftrightarrow \cos \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) \cdot \sin x = \cos \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) \Leftrightarrow (\sin x - 1) \cdot \cos \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) = 0$$

$$+ \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}), \text{ thỏa (*)} \quad + \cos \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}), \text{ thỏa (*)}$$

Vậy, phương trình có nghiệm: $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi; x = \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$.

$$10) \sin x \cos 2x + \cos^2 x (\tan^2 x - 1) + 2 \sin^3 x = 0$$

Điều kiện $\cos x \neq 0$

$$\sin x \cos 2x + \cos^2 x (\tan^2 x - 1) + 2 \sin^3 x = 0 \Leftrightarrow \sin x (1 - 2 \sin^2 x) + 2 \sin^2 x - 1 + 2 \sin^3 x = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = -1 \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi; x = \frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi.$$

Kết hợp điều kiện, phương trình có nghiệm $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi \right\}$

HT 9. Giải các phương trình sau:

$$1) \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) - \sin x - 3 \cos x + 2 = 0$$

$$2) \frac{2 \cos^2 x + \sqrt{3} \sin 2x + 3}{2 \cos^2 x \cdot \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)} = 3 (\tan^2 x + 1)$$

$$3) \frac{3 - 4 \cos 2x - 8 \sin^4 x}{\sin 2x + \cos 2x} = \frac{1}{\sin 2x}$$

$$4) \sin^2 x + \sin^2 \left(\frac{\pi}{3} - x \right) + \sin^2 \left(\frac{\pi}{3} + x \right) = 2\sqrt{3} \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) \cdot \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$5) \frac{3 \cot^2 x + 2\sqrt{2} \sin^2 x - (2 + 3\sqrt{2}) \cos x}{2 \sin x + \sqrt{3}} = 0$$

6) $\frac{\cos x(\cos x + 2 \sin x) + 3 \sin x(\sin x + \sqrt{2})}{\sin 2x - 1} = 1$

7) $\frac{1}{\sqrt{2}} \cot x + \frac{\sin 2x}{\sin x + \cos x} = 2 \sin(x + \frac{\pi}{2})$

8) $\frac{2 \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x + 1}{2 \cos 2x} = \sqrt{3} \cos x - \sin x$

9) $\sin^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{7\pi}{4} \right) \tan^2(3\pi - x) - \cos^2 \frac{x}{2} = 0.$

10) $\frac{\sin^3 x \sin 3x + \cos^3 x \cdot \cos 3x}{\tan \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \tan \left(x + \frac{\pi}{3} \right)} = -\frac{1}{8}$

<http://www.LuuHuyThuong.blogspot.com>

Bài giải

1) $\sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) - \sin x - 3 \cos x + 2 = 0$

$\sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) - \sin x - 3 \cos x + 2 = 0 \Leftrightarrow \sin 2x + \cos 2x - \sin x - 3 \cos x + 2 = 0$

$\Leftrightarrow 2 \sin x \cos x - \sin x + 2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x(2 \cos x - 1) + (\cos x - 1)(2 \cos x - 1) = 0$

$\Leftrightarrow (2 \cos x - 1)(\sin x + \cos x - 1) = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2}, \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Nghiệm phương trình: $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = k2\pi, x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$

2) $\frac{2 \cos^2 x + \sqrt{3} \sin 2x + 3}{2 \cos^2 x \cdot \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)} = 3 \left(\tan^2 x + 1 \right).$

Điều kiện: $\begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x \neq -\frac{\pi}{3} + k\pi \end{cases} (k \in Z) (*)$.

Khi đó: Phương trình đã cho tương đương với: $\cos 2x + \sqrt{3} \sin 2x + 4 = 2 \cos^2 x \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) \frac{3}{\cos^2 x}$

$\Leftrightarrow \cos 2x \cdot \cos \frac{\pi}{3} + \sin 2x \cdot \sin \frac{\pi}{3} + 2 = 3 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$

$\Leftrightarrow \cos \left(2x - \frac{\pi}{3} \right) - 3 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) + 2 = 0 \Leftrightarrow 2 \cos^2 \left(x - \frac{\pi}{6} \right) - 3 \cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) + 1 = 0$

$$\Leftrightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 1, \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

Với $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 1 \Leftrightarrow x - \frac{\pi}{6} = k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$, thỏa (*)

$$\text{Với } \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}), \text{ thỏa (*)}$$

Vậy, phương trình có nghiệm: $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

3) $\frac{3 - 4 \cos 2x - 8 \sin^4 x}{\sin 2x + \cos 2x} = \frac{1}{\sin 2x}$

Điều kiện: $\begin{cases} \sin 2x + \cos 2x \neq 0 \\ \sin 2x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -\frac{\pi}{8} + l\frac{\pi}{2} (l \in \mathbb{Z}) \\ x \neq l\frac{\pi}{2} \end{cases}$

Ta có: $8 \sin^4 x = 8 \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 = \dots = 3 - 4 \cos 2x + \cos 4x$

Phương trình $\Leftrightarrow \frac{3 - 4 \cos 2x - (3 - 4 \cos 2x + \cos 4x)}{\sin 2x + \cos 2x} = \frac{1}{\sin 2x}$

$$\Leftrightarrow \frac{-\cos 4x}{\sin 2x + \cos 2x} = \frac{1}{\sin 2x} (\text{do } \sin 2x + \cos 2x \neq 0, \sin 2x \neq 0)$$

$$\Leftrightarrow -(\cos 2x - \sin 2x) = \frac{1}{\sin 2x} \Leftrightarrow \cos 2x (\sin 2x + \cos 2x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos 2x = 0 \vee \sin 2x + \cos 2x = 0 (\text{loai}) \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy nghiệm của phương trình: $x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$

4) $\sin^2 x + \sin^2\left(\frac{\pi}{3} - x\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3} + x\right) = 2\sqrt{3} \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \cdot \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}$

Ta có $\sin^2 x + \sin^2\left(\frac{\pi}{3} - x\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3} + x\right) = 2\sqrt{3} \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \cdot \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\Leftrightarrow \frac{1 - \cos 2x + 1 - \cos\left(\frac{2\pi}{3} - 2x\right) + 1 + \cos\left(\frac{2\pi}{3} - 2x\right)}{2} = \sqrt{3} \left(\sqrt{3} \sin x + \cos x\right) \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3 - \cos 2x - 2 \cos \frac{2\pi}{3} \cos 2x}{2} = 3 \sin x \cos x + \sqrt{3} \cos^2 x - \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow 3 = 3 \sin 2x + \sqrt{3} (2 \cos^2 x - 1)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{3} \Leftrightarrow \sin 2x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos 2x \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin \left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{3}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x + \frac{\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

5) $\frac{3 \cot^2 x + 2\sqrt{2} \sin^2 x - (2 + 3\sqrt{2}) \cos x}{2 \sin x + \sqrt{3}} = 0$

Điều kiện: $\cos x \neq 0, \sin x \neq -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Khi đó pt đã cho $\Leftrightarrow (3 \cot^2 x - 3\sqrt{2} \cos x) + (2\sqrt{2} \sin^2 x - 2 \cos x) = 0$

$$\Leftrightarrow 3 \cos x \left(\frac{\cos x}{\sin^2 x} - \sqrt{2} \right) + 2(\sqrt{2} \sin^2 x - \cos x) = 0 \Leftrightarrow (3 \cos x - 2 \sin^2 x)(\sqrt{2} \sin^2 x - \cos x) = 0$$

+ $\cos x - \sqrt{2} \sin^2 x = 0 \Leftrightarrow \sqrt{2} \cos^2 x + \cos x - \sqrt{2} = 0$

$$\cos x = -\sqrt{2} (L), \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{4} + k2\pi$$

+ $3 \cos x - 2 \sin^2 x = 0 \Leftrightarrow 2 \cos^2 x + 3 \cos x - 2 = 0$

$$\Leftrightarrow \cos x = -2 (L), \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi .$$

Đối chiếu với đ/k bài toán thì pt chỉ có 3 họ nghiệm: $x = \pm \frac{\pi}{4} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

6) $\frac{\cos x (\cos x + 2 \sin x) + 3 \sin x (\sin x + \sqrt{2})}{\sin 2x - 1} = 1$

Điều kiện: $\sin 2x \neq 1$.

Pt $\Leftrightarrow \cos^2 x + 2 \sin x \cos x + 3 \sin^2 x + 3\sqrt{2} \sin x = \sin 2x - 1 \Leftrightarrow 2 \sin^2 x + 3\sqrt{2} \sin x + 2 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{-\sqrt{2}}{2} \\ \sin x = -\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$$

Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm: $x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi$.

$$7) \frac{1}{\sqrt{2}} \cot x + \frac{\sin 2x}{\sin x + \cos x} = 2 \sin(x + \frac{\pi}{2})$$

Điều kiện: $\sin x \neq 0, \sin x + \cos x \neq 0$.

$$\text{Pt: } \frac{\cos x}{\sqrt{2} \sin x} + \frac{2 \sin x \cos x}{\sin x + \cos x} - 2 \cos x = 0 \Leftrightarrow \frac{\cos x}{\sqrt{2} \sin x} - \frac{2 \cos^2 x}{\sin x + \cos x} = 0 \Leftrightarrow \cos x \left(\sin(x + \frac{\pi}{4}) - \sin 2x \right) = 0$$

$$+) \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$+) \sin 2x = \sin(x + \frac{\pi}{4}) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = x + \frac{\pi}{4} + m2\pi \\ 2x = \pi - x - \frac{\pi}{4} + n2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + m2\pi \\ x = \frac{\pi}{4} + \frac{n2\pi}{3} \end{cases} \quad m, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{t2\pi}{3}, \quad t \in \mathbb{Z}$$

Đổi chiều điều kiện ta có nghiệm của pt là: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi; \quad x = \frac{\pi}{4} + \frac{t2\pi}{3}, \quad k, t \in \mathbb{Z}$

$$8) \frac{2 \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x + 1}{2 \cos 2x} = \sqrt{3} \cos x - \sin x$$

Điều kiện: $\cos 2x \neq 0$ (*)

$$\text{Pt đã cho} \Leftrightarrow \frac{3 \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x + \sin^2 x}{2 \cos 2x} = \sqrt{3} \cos x - \sin x$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{3} \cos x - \sin x)^2 = 2 \cos 2x \quad (\sqrt{3} \cos x - \sin x)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{3} \cos x - \sin x = 0 \\ 2 \cos 2x = \sqrt{3} \cos x - \sin x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \tan x = \sqrt{3} \\ \cos 2x = \cos(x + \frac{\pi}{6}) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, x = -\frac{\pi}{18} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases}$$

Các nghiệm đều TMĐK (*) nên phương trình đã cho có 3 họ nghiệm:

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, \quad x = -\frac{\pi}{18} + k\frac{2\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$9) \sin^2 \left(\frac{x}{2} + \frac{7\pi}{4} \right) \tan^2(3\pi - x) - \cos^2 \frac{x}{2} = 0.$$

Đ/k: $\cos x \neq 0$

Pt đã cho

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \sin^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \tan^2 x - \cos^2 \frac{x}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right] \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} - \frac{1}{2}(1 + \cos x) = 0 \\ &\Leftrightarrow (1 - \sin x)(1 - \cos^2 x) - (1 + \cos x)(1 - \sin^2 x) = 0 \Leftrightarrow (1 - \sin x)(1 + \cos x)(\sin x + \cos x) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 & \text{loai} \\ \cos x = -1 \\ \tan x = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (2k+1)\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$10) \frac{\sin^3 x \sin 3x + \cos^3 x \cos 3x}{\tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right)} = -\frac{1}{8}$$

Điều kiện: $x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$

$$\text{Ta có } \tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \tan\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \cot\left(-x + \frac{\pi}{6}\right) = -1$$

Phương trình tương đương với: $\sin^3 x \sin 3x + \cos^3 x \cos 3x = -\frac{1}{8}$

$$\Leftrightarrow \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot \frac{\cos 2x - \cos 4x}{2} + \frac{1 + \cos 2x}{2} \cdot \frac{\cos 2x + \cos 4x}{2} = -\frac{1}{8}$$

$$\Leftrightarrow 2(\cos 2x - \cos 2x \cos 4x) = -\frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \cos^3 x = \frac{1}{8} \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2}$$

$$x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \text{ và } x = \frac{\pi}{6} + k\pi \text{ (loại)}$$

$$\text{Vậy: } x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$$

HT 10. Giải các phương trình sau:

$$1) \sin 3x + \sin 2x + \sin x + 1 = \cos 3x + \cos 2x - \cos x.$$

$$2) (\tan x + 1) \sin^2 x + \cos 2x + 2 = 3(\cos x + \sin x) \sin x.$$

$$3) \sqrt{2} \cos 5x - \sin(\pi + 2x) = \sin\left(\frac{5\pi}{2} + 2x\right) \cdot \cot 3x.$$

$$4) \frac{6\sqrt{2} \sin^3 2x + 8 \cos^3 x + 3\sqrt{2} \cos\left(\frac{17\pi}{2} - 4x\right) \cos 2x}{\cos x} = 16$$

$$5) \frac{\sqrt{3}}{\cos^2 x} + \frac{4}{\sin 2x} = 2(\cot x + \sqrt{3})$$

6) $\cos 2x + 2 \sin x - 1 - 2 \sin x \cos 2x = 0$

<http://www.Luuuhuythuong.blogspot.com>

Bài giải

1) $\sin 3x + \sin 2x + \sin x + 1 = \cos 3x + \cos 2x - \cos x.$

$$\Leftrightarrow 2 \sin 2x \cos x + 2 \sin x \cos x + 2 \sin^2 x = -2 \sin 2x \cos x$$

$$\Leftrightarrow \sin 2x(\cos x + \sin x) + \sin x(\cos x + \sin x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x(2 \cos x + 1)(\cos x + \sin x) = 0.$$

Từ đó ta có các trường hợp sau

*) $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

*) $2 \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

*) $\cos x + \sin x = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm $x = k\pi, x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

2) $(\tan x + 1)\sin^2 x + \cos 2x + 2 = 3(\cos x + \sin x)\sin x.$

Điều kiện: $\cos x \neq 0$, hay $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Khi đó phương trình đã cho tương đương với

$$(\tan x + 1)\sin^2 x + 1 - 2 \sin^2 x + 2 = 3(\cos x + \sin x)\sin x$$

$$\Leftrightarrow (\tan x - 1)\sin^2 x + 3 = 3(\cos x - \sin x)\sin x + 6 \sin^2 x$$

$$\Leftrightarrow (\tan x - 1)\sin^2 x + 3 \cos 2x = 3(\cos x - \sin x)\sin x$$

$$\Leftrightarrow (\tan x - 1)\sin^2 x + 3(\cos x - \sin x)\cos x = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sin x - \cos x)(\sin^2 x - 3 \cos^2 x) = 0 \Leftrightarrow (\sin x - \cos x)(2 \cos 2x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin x = \cos x, \cos 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm $x = \frac{\pi}{4} + k\pi, x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$

3) $\sqrt{2} \cdot \cos 5x - \sin(\pi + 2x) = \sin\left(\frac{5\pi}{2} + 2x\right) \cdot \cot 3x.$

ĐK: $\sin 3x \neq 0$

$$\text{pt} \Leftrightarrow \sqrt{2}\cos 5x + \sin 2x = \cos 2x \cdot \cot 3x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2}\cos 5x \sin 3x + \sin 2x \cos 3x = \cos 2x \cdot \cos 3x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2}\cos 5x \sin 3x - \cos 5x = 0 \Leftrightarrow \cos 5x(\sqrt{2} \sin 3x - 1) = 0$$

$$+) \sin 3x = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0 \text{ (t/m dk)} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + \frac{k2\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{4} + \frac{k2\pi}{3} \end{cases} \quad +) \cos 5x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{10} + \frac{k\pi}{5} \text{ t/m dk}$$

$$4) \frac{6\sqrt{2} \sin^3 2x + 8 \cos^3 x + 3\sqrt{2} \cos(\frac{17\pi}{2} - 4x) \cos 2x}{\cos x} = 16 \text{ với } x \in (\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2})$$

$$\text{Ta có: } \cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\text{Với dk pt(1)} \Leftrightarrow 8 \cos^3 x + 6\sqrt{2} \sin 2x (\sin^2 2x + \cos^2 2x) = 16 \cos x$$

$$\Leftrightarrow 4 \cos^3 x + 3\sqrt{2} \sin 2x = 8 \cos x \Leftrightarrow (2 \cos^2 x + 3\sqrt{2} \sin x - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \sin^2 x - 3\sqrt{2} \sin x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k2\pi, x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm $x \in (\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2})$ là $x = \frac{3\pi}{4}; x = \frac{9\pi}{4}$

$$5) \frac{\sqrt{3}}{\cos^2 x} + \frac{4}{\sin 2x} = 2(\cot x + \sqrt{3})$$

$$\text{Điều kiện } \sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{k\pi}{2}.$$

$$\text{Ta có } \sqrt{3}(1 + \tan^2 x) + \frac{4}{\sin 2x} - 2\sqrt{3} = 2\cot x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3}\tan^2 x + \frac{2(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin x \cos x} - \sqrt{3} = 2\cot x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3}\tan^2 x + 2\tan x - \sqrt{3} = 0$$

$$\tan x = -\sqrt{3} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \quad \tan x = \frac{1}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\pi$$

6) Giải phương trình: $\cos 2x + 2 \sin x - 1 - 2 \sin x \cos 2x = 0$ (1)

$$(1) \Leftrightarrow \cos 2x(1 - 2 \sin x) - (1 - 2 \sin x) = 0 \Leftrightarrow (\cos 2x - 1)(1 - 2 \sin x) = 0$$

Khi $\cos 2x = 1 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

$$\text{Khi } \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \text{ hoặc } x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$$



Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn học sinh đã đọc tài liệu này!

Mọi sự góp ý xin gửi về: huythuong2801@gmail.com

Toàn bộ tài liệu ôn thi môn toán của Lưu Huy Thường ở địa chỉ sau:

<http://www.LuuHuyThuong.blogspot.com>

LƯU HUY THƯỜNG